МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП-003721-170818
СОГЛАСОВАНО

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Гидроксиэтилкрахмал 200
наименование лекарственного препарата
раствор для инфузий 6 %
лекарственная форма, дозировка

Федеральное казенное предприятие
«Курская биофабрика – фирма «БИОК», Россия
наименование производителя, страна

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «____» 170818 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав: Гидроксиэтилкрахмал 200/05 - 60 г *Вспомогательные вещества* Натрия хлорид - 9 г Вода для инъекций - до 1 л Теоретическая осмолярность - 308 мОсм/л	**Состав:** *Действующее вещество* Гидроксиэтилкрахмал 200/05 - 60 г *Вспомогательные вещества* Натрия хлорид - 9 г Вода для инъекций - до 1 л Теоретическая осмолярность - 308 мОсм/л
Противопоказания Гиперчувствительность (в том числе к крахмалу), внутричерепная гипертензия, внутричерепное кровотечение, декомпенсированная хроническая сердечная недостаточность (ХСН), нарушение функции почек, кардиогенный отек легких, ожоги, состояние после	**Противопоказания** Повышенная чувствительность к компонентам препарата, сепсис, ожоги, почечная недостаточность или проведение заместительной почечной терапии, продолжающееся внутричерепное или внутримозговое кровотечение, пациенты реанимационного профи-

Старая редакция	Новая редакция
трансплантации органов, первый триместр беременности, тяжелая печеночная недостаточность, детский возраст до 18 лет, гипергидратация, гиперволемия, дегидратация (при необходимости коррекции электролитного обмена), выраженные нарушения свертывающей системы крови (в том числе тяжелый геморрагический диатез, гипокоагуляция), гиперхлоремия, гипернатриемия, гипокалиемия, проведение гемодиализа, применение у тяжелобольных пациентов, находящихся в критическом состоянии (как правило, пациенты, находящиеся в отделениях реанимации, интенсивной терапии), в том числе при сепсисе, пациенты, подвергшиеся операциям на открытом сердце в условиях искусственного кровообращения	ля (обычно находящиеся в отделении реанимации и интенсивной терапии), гипергидратация, отек легких, дегидратация, тяжелая гипернатриемия или тяжелая гиперхлоремия, тяжелая печеночная недостаточность, хроническая сердечная недостаточность, тяжелая коагулопатия; пациенты, перенесшие трансплантацию органов
Способ применения и дозы Вводят внутривенно капельно или струйно. Дозу и скорость введения устанавливают индивидуально в зависимости от выраженности нарушений гемодинамики, тяжести состояния пациента. Первые 10-20 мл следует вводить медленно, тщательно наблюдая за пациентом (возможность развития анафилактоидных реакций). Применение препарата следует ограничить первыми 24 часами восстановления объема циркулирующей крови (ОЦК). Необходимо использовать самую низкую эффективную дозу. Максимальная суточная доза препарата для раствора с концентрацией 6 % составляет 30 мл/кг/сут, что соответствует 2,25 л на 75 кг	**Способ применения и дозы** Вводят внутривенно капельно или струйно. Дозу и скорость введения устанавливают индивидуально в зависимости от выраженности нарушений гемодинамики, тяжести состояния пациента. Первые 10 - 20 мл следует вводить медленно, тщательно наблюдая за пациентом (возможность развития анафилактоидных реакций). Применение препарата следует ограничить первыми 24 часами восстановления объема циркулирующей крови (ОЦК). Необходимо использовать самую низкую эффективную дозу. Максимальная суточная доза для 6 % ГЭК 200/0,5 – 30 мл/кг массы тела

Старая редакция	Новая редакция
массы тела или 1,8 г/кг гидроксиэтилкрахмала; максимальная скорость введения – 20 мл/кг/ч	***Применение в педиатрии*** Опыт медицинского применения у детей ограничен, в связи с чем применение препаратов ГЭК у данной возрастной группы не рекомендуется

Директор
ФКП «Курская биофабрика» В.М. Безгин

