П N014506/01-060911

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Рефортан® ГЭК 10 %

Раствор для инфузий, 10 %

Берлин-Хеми АГ, Германия

Изменение № 1

Дата внесения Изменения "____" 060911 20____ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав на 1 литр *Действующее вещество:* гидроксиэтилкрахмал (ГЭК 200/0,5) – 100,0 г; *вспомогательные вещества:* натрия хлорид, вода для инъекций. Теоретическая осмолярность: ~ 300 мОсмоль/л Коллоидно-осмотическое давление: ~ 85 мбар ≅ 65 мм рт. ст. Значение pH: от 4,0 до 7,0	**Состав на 1 литр** *Действующее вещество:* гидроксиэтилкрахмал (ГЭК 200/0,5) – 100,0 г. *Вспомогательные вещества:* натрия хлорид – 9,00 г, вода для инъекций – 931,00 г. Теоретическая осмолярность: ~ 300 мОсмоль/л Коллоидно-осмотическое давление: ~ 85 мбар ≅ 65 мм рт. ст. Значение pH: от 4,0 до 7,0

Адрес для предъявления претензий: 115162 г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр.Б, тел. (495) 785-59-55, факс (495) 785-59-58	**Адрес для предъявления претензий:** 123317, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, тел. (495) 797-59-55, факс (495) 797-59-58

Медицинский директор О.Г. Аксенова

