П N014508/01-060612

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Стабизол® ГЭК 6%

раствор для инфузий , 6%

Берлин-Хеми АГ, Германия

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «06» июня 2012 г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав на 1 литр: *Действующее вещество:* Гидроксиэтилкрахмал (ГЭК 450 / 0,7) - 60,00 г *Вспомогательные вещества:* натрия хлорид, вода для инъекций. Теоретическая осмолярность: ~ 300 мОсмоль/л Коллоидно-осмотическое давление: ~ 24 мбар ≅ 18 мм рт. ст. Значение pH: 4,0 - 7,0	**Состав на 1 литр:** *Действующее вещество:* Гидроксиэтилкрахмал (ГЭК 450 / 0,7) - 60,00 г *Вспомогательные вещества:* натрия хлорид – 9,00 г, вода для инъекций – 956,29 г. Осмолярность: ~ 300 мОсмоль/л Коллоидно-осмотическое давление: ~ 24 мбар ≅ 18 мм рт. ст. Значение pH: 4,0 - 7,0

Адрес для предъявления претензий: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б, тел. (495) 797-59-55, факс (495) 797-59-58	**Адрес для предъявления претензий:** 123317, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, БЦ «Башня на Набережной», Блок Б. Тел. (495) 785-01-00, факс (495) 785-01-01

Медицинский директор О.Г. Аксенова