ЛП-№(013570)-(РГ-RU) от 16.02.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.02.2026 № 2567
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0000)

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Искусственная слеза®

Регистрационный номер:

Торговое наименование препарата: Искусственная слеза®

Международное непатентованное наименование: гипромеллоза

Лекарственная форма: капли глазные

Состав на 1 мл:

Действующее вещество: гипромеллоза 5,0 мг.

Вспомогательные вещества: борная кислота, гистидина гидрохлорид моногидрат, натрия тетраборат, натрия хлорид, калия хлорид, динатрия эдетат дигидрат, макрогол 400, вода очищенная.

Описание: Прозрачный бесцветный или со слабым желтоватым оттенком слегка вязкий раствор.

Фармакотерапевтическая группа: кератопротекторное средство.

Код АТХ: S01XA20

Фармакологическое действие:

Протектор эпителия роговицы, оказывает смазывающее и смягчающее действие, обладает высокой вязкостью, увеличивает продолжительность контакта раствора с роговицей. Показатель преломления раствора аналогичен естественным слезам. Восстанавливает, стабилизирует и воспроизводит оптические характеристики слезной пленки. Удлиняет действие других глазных капель и защищает роговицу от их раздражающего действия. Субъективное и объективное улучшение состояния (эпителизация, уменьшение гиперемии и очагов поражения) обычно наступает в течение 3-5 дней, выраженное улучшение или полное излечение – в течение 2-3 недель.

Показания к применению

– недостаточное слезоотделение, лагофтальм, деформация век, эктропион, состояние после пластических операций на веках, эрозия и трофические язвы роговицы, состояние после химических и термических ожогов роговицы и конъюнктивы, буллезные дистрофические изменения роговицы, кератопатия, микродефекты роговичного эпителия, состояние после кератопластики, кератоэктомии;

– для удлинения действия или устранения раздражающего действия других глазных капель;

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.02.2026 № 2567
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0000)

– комбинированное лечение синдрома «сухих глаз»: синдром Стивенса-Джонсона, синдром или болезнь Шегрена, ксероз, кератоз (часто в сочетании с терапевтическими контактными линзами);

– раздражение глаз, вызванное дымом, пылью, холодом, ветром, солнцем, соленой водой, при аллергии;

– напряжение глаз при длительной работе на компьютере, вождении автомобиля;

– проведение диагностических процедур: гониоскопия, электроретинография, электроокулография, УЗИ глаз.

Противопоказания

Гиперчувствительность к отдельным компонентам препарата, инфекционные заболевания глаз.

С осторожностью

Острая фаза химического ожога роговицы и конъюнктивы (до полного удаления токсичных веществ и некротизированных тканей).

Нет данных по использованию препарата у детей, поэтому применять препарат следует только по назначению лечащего врача, если ожидаемая польза превышает потенциальный риск.

Беременность и лактация

Опыта применения препарата во время беременности и лактации нет. Применение у беременных и кормящих матерей возможно только по назначению лечащего врача, если ожидаемый лечебный эффект превышает риск возможных побочных эффектов.

Способ применения и дозы

В конъюнктивальный мешок закапывают по 1-2 капли 4-8 раз в сутки, при необходимости можно вводить каждый час. Курс лечения – не менее 2-3 недель при нозологиях, требующих длительного применения.

Побочное действие

Чувство склеивания век (из-за вязкости раствора), временный дискомфорт после закапывания препарата, аллергические реакции.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Не совместим с глазными каплями, содержащими соли металлов.

Особые указания

Сразу после инстилляции возможна нечеткость зрительного восприятия, поэтому рекомендуется приступать к управлению автомобилем или работе с механизмами через 15 минут после закапывания препарата. Контактные линзы снимают до инстилляции препарата и устанавливают снова не ранее, чем через 30 минут после закапывания.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.02.2026 № 2567
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0000)

Форма выпуска

Капли глазные 0,5 %. По 10 мл во флаконах полимерных с дозаторами-капельницами и крышками с контролем первого вскрытия. По 1 флакону вместе с инструкцией по применению в пачке из картона.

Срок годности

2 года. Вскрытый флакон хранить не более 30 дней.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С в защищенном от света месте. Хранить в местах, недоступных для детей.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель/Организация, принимающая претензии от потребителя

ООО «Фирн М», 108804, г. Москва, вн.тер.г. м.о. Внуково, дп. Кокошкино, ул. Дзержинского, д. 4А

Тел.: 8 (495) 956-15-43