ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

БРОНХОЦИН®

Регистрационный номер:
Торговое название препарата: БРОНХОЦИН®
Международное непатентованное или группировочное название: Глауцин + Эфедрин + Базилика обыкновенного масло
Лекарственная форма: сироп

Состав:
125 г сиропа содержат:
Активные вещества:
глауцина гидробромид - 0,125 г; эфедрина гидрохлорид - 0,100 г; базилика обыкновенного масло - 0,125 г.
1 мерная ложка (5 мл) содержит:
Активные вещества:
глауцина гидробромид – 5,75 мг; эфедрина гидрохлорид – 4,6 мг; базилика обыкновенного масло – 5,75 мг.
Вспомогательные вещества: лимонной кислоты моногидрат, сахароза, полисорбат-80, метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат, этанол (96 %), вода очищенная.

Описание
Вязкая жидкость от прозрачной до слабо опалесцирующей от бесцветного до бесцветного с желтоватым оттенком цвета с характерным запахом базилика.

Фармакотерапевтическая группа
Противокашлевое средство комбинированное (противокашлевое средство центрального действия + симпатомиметическое средство)
Код АТХ: R05DB20

Фармакологические свойства
Фармакодинамика
БРОНХОЦИН® представляет собой комбинированный препарат с противокашлевым и бронхорасширяющим действием. Он оказывает комплексное воздействие на дыхательную и центральную нервную систему, что делает его средством выбора при лечении кашля различной этиологии.

48124

Глауцина гидробромид оказывает подавляющее действие на центр кашля, не влияя на дыхание. Обладает и слабым бронхолитическим и секретолитическим действием.
Эфедрин стимулирует дыхание, расширяет бронхи и за счет сосудосуживающего действия уменьшает отек их слизистой оболочки.
Масло базилика оказывает седативное, противовоспалительное, анестезирующее и слабое антисептическое действие.

Фармакокинетика
Глауцин и *эфедрин* хорошо всасываются в пищеварительном тракте, создавая и поддерживая необходимые терапевтические уровни в плазме крови. Выделяются, главным образом, через почки.

Показания к применению
Комплексная терапия заболеваний дыхательной системы, сопровождающихся сухим кашлем: острые воспалительные заболевания верхних дыхательных путей, острые и хронические бронхиты, трахеобронхиты, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма, пневмония, бронхоэктатическая болезнь, коклюш.

Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, ишемическая болезнь сердца, коронарный атеросклероз, стенокардия, артериальная гипертензия, хроническая сердечная недостаточность, сахарный диабет, тиреотоксикоз, феохромоцитома, бессонница, закрытоугольная глаукома, гипертрофия предстательной железы (с клиническими симптомами), детский возраст (до 6 лет), беременность (I триместр), период грудного вскармливания.
С осторожностью: пациенты со склонностью к развитию лекарственной зависимости. Из-за содержания в составе препарата этанола следует соблюдать осторожность у пациентов с заболеванием печени, алкоголизмом, эпилепсией, заболеваниями головного мозга, у детей.
Беременность и период лактации
Бронхоцин® не следует принимать в первом триместре беременности. Независимо от того, что нет данных об эмбриотоксическом и тератогенном эффектах, применение препарата беременным женщинам возможно только в том случае, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или младенца.

Способ применения и дозы
Внутрь.
Взрослым - по 2 мерные ложки (10 мл) 3 - 4 раза в день.

Детям с 6 до 10 лет - по 1 мерной ложке (5 мл) 3 раза в день.
Детям старше 10 лет - по 2 мерные ложки (10 мл) 3 раза в день.

Побочное действие

Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, экстрасистолия, повышение артериального давления.

Со стороны нервной системы: тремор, возбуждение, бессонница, головокружение.

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, анорексия и запор.

Со стороны эндокринной системы: повышение либидо, дисменорея.

Со стороны мочевыделительной системы: затруднение мочеиспускания, задержка мочи у больных с гипертрофией предстательной железы.

Со стороны кожи и слизистых оболочек: сыпь, усиление потоотделения.

Другие: нарушение зрения, тахифилаксия.

У детей – сонливость.

Передозировка

Симптомы: возможно появление нервного возбуждения, лихорадки, бессонницы, диареи, обильного потоотделения, тошноты, рвоты, потери аппетита, нарушения кровообращения, тремора конечностей, головокружения, затруднения мочеиспускания.

Эфедрин, применяемый в высоких дозах, приводит к повышению уровня сахара в крови. Летальная пероральная доза эфедрина составляет 1,0 г.

Лечение: промывания желудка и применения симптоматических средств.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Бронхоцин® можно одновременно применять с антибиотиками, жаропонижающими и витаминами.

Из-за наличия в составе препарата эфедрина, необходимо иметь в виду его лекарственные взаимодействия: ослабляет эффекты наркотических и снотворных средств. При применении одновременно с сердечными гликозидами, хинидином, трициклическими антидепрессантами возрастает риск развития аритмий. При одновременном применении с резерпином и ингибиторами моноаминооксидазы возможно резкое повышение артериального давления, с неселективными бета-адреноблокаторами – уменьшение бронхолитического действия. Снижает действие симпатолитиков.

Нет данных о неблагоприятных лекарственных взаимодействиях глауцина с другими лекарственными средствами.

Особые указания

Не рекомендуется назначать препарат больным сахарным диабетом, поскольку эфедрин, применяемый в дозах, превышающих терапевтические, повышает обмен веществ, приводя, таким образом, к повышению уровня сахара крови.

Следует воздержаться от вождения автотранспорта и занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций, из-за возможного появления головокружения и нарушения зрения.

При применении препарата следует учитывать, что 1 мерная ложка – 5 мл содержит до 0,069 г этанола (96% - 1,7 об.%)

Форма выпуска

Сироп.

По 125 г во флаконы коричневого стекла или коричневые флаконы из полиэтилентерефталата. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению и мерной ложкой на 5 мл помещают в отдельную картонную пачку.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности

4 года. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек:

По рецепту.

Название и адрес изготвителя:

БАЛКАНФАРМА-ТРОЯН АД, Болгария

5600 Троян, ул. „Крайречна" 1.

Тел. (++359 670) 68-104

Факс (++359 670) 62-610

Претензии потребителей направлять по адресу:

ООО „Актавис"

127018, Москва, ул. Сущевский вал, д. 18

Тел. 644-44-14, факс: 644-44-24

Представитель фирмы Вахнина Е.В.

РОСЗДРАВНАДЗОРА
ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ
ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА