ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата

БРОНХОЛИН ШАЛФЕЙ

Регистрационный номер:

Торговое название препарата: Бронхолин Шалфей

Международное непатентованное название (МНН): Нет

Лекарственная форма: сироп

Состав: 125 г сиропа содержат:

глауцина гидробромида	0,125 г
эфедрина гидрохлорида	0,100 г
масла шалфея	0,125 г
сахар	43,750 г
кислота лимонная	0,075 г
кислота аскорбиновая	0,050 г
нипагин	0,1625 г
нипазол	0,025 г
вода очищенная	до 125 г

Описание
Сиропообразная жидкость от бесцветного до желтого цвета, горьковато-сладкого вкуса с характерным запахом масла шалфея.

Фармакологические свойства

Фармакотерапевтическая группа:
Противокашлевое средство центрального действия+симпатомиметик.

Код АТХ RO5DB20

Фармакодинамика
БРОНХОЛИН ШАЛФЕЙ сироп представляет собой комбинированный

препарат с противокашлевым и бронхорасширяющим действием.
Глауцина гидробромид оказывает подавляющее действие на кашлевой центр, не влияя на дыхание. Обладает и слабым бронхоспазмолитическим и секретолитическим действием.
Эфедрин - симпатомиметическое средство, возбуждает дыхание, расширяет бронхи и уменьшает отек их слизистой оболочки.
Масло шалфея оказывает противовоспалительное и слабое противомикробное действие.

Фармакокинетика
Глауцин и *эфедрин* хорошо всасываются в пищеварительном тракте, создавая и поддерживая необходимые терапевтические уровни в плазме крови. Выделяются, главным образом, с мочой.

Показания к применению
Препарат применяют в комплексной терапии при лечении острых и хронических бронхитов, трахеобронхитов, бронхиальной астмы, коклюша для устранения кашля и бронхоконстрикции.

Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, сердечная недостаточность, аритмии, коронарный атеросклероз, феохромоцитома, глаукома, сахарный диабет, гипертиреоз, аденома предстательной железы, бессонница, беременность, период лактации. Детский возраст до 3 лет.
С осторожностью - больным, склонным к развитию лекарственной зависимости.

Способ применения и дозы
Внутрь.
Взрослым - по 1 столовой ложке 3 - 4 раза в день.
Детям старше 3 лет до 10 лет - по 1 чайной ложке 3 раза в день.
Детям старше 10 лет - по 2 чайные ложки 3 раза в день.

Побочное действие
Аллергические реакции.
Побочные действия являются результатом, главным образом, действия эфедрина: повышение артериального давления, сердцебиение, повышенная нервная возбудимость, бессонница, головокружение, тошнота, потливость, затруднение мочеиспускания, угнетение кишечной перистальтики, мидриаз. Снижает аппетит. У детей возможна сонливость.

Передозировка
В случае приема препарата в дозах, превышающих назначенные врачом, может наблюдаться передозировка, симптомами которой являются возбуждение, лихорадка, бессонница, тошнота, рвота, понос. Эфедрин, применяемый в высоких дозах, приводит к повышению уровня сахара в крови. Летальная пероральная доза эфедрина составляет 1,0 г. Лечение: промывание желудка, затем симптоматическая терапия.

Предупреждения
- Несмотря на то, что БРОНХОЛИН ШАЛФЕЙ не вызывает привыкания, учитывая состав препарата, с осторожностью назначают пациентам, склонным к развитию лекарственной зависимости;
- Наличие эфедрина требует особого внимания при назначении препарата больным, страдающим артериальной гипертензией, так как он вызывает сужение периферических сосудов.
- Не рекомендуется назначать препарат больным сахарным диабетом, поскольку эфедрин, применяемый в дозах, превышающих терапевтические, повышает обмен веществ, приводя, таким образом, к повышению уровня сахара крови.
- Не рекомендуется применение в больших дозах водителям.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами
При комбинированном применении эфедрина с ингибиторами моноаминооксидазы могут наступить тяжелые гипертензивные кризы из-за подавления метаболизма этих вазопрессорных субстанций. Эфедрин ослабляет действие опиоидных анальгетиков и других средств, угнетающих ЦНС. При одновременном применении с неселективными бета- адреноблокаторами уменьшается бронхолитическое действие препарата.

Форма выпуска
Сироп
По 125 г во флакон из оранжевого стекла.
Каждый флакон вместе с инструкцией по применению в пачку картонную.

Условия хранения
Список Б.
В защищенном от света месте, при температуре 8 -25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности
4 года
Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек:
По рецепту врача.

Название и адрес изготовителя :
АО "ХИМФАРМ", г. Шымкент, Республика Казахстан, ул. Рашидова, б/н, т/ф: 560882

Директор ИДКЭЛС,
профессор В.В. Чельцов

Генеральный директор
АО «Химфарм» С.А. Баймуканов