ЛП-№(008128)-(РГ-RU) от 26.11.2025

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.12.2024 № 27421
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

## ГЛИЦЕРИН

**Регистрационный номер:**

**Торговое наименование:** ГЛИЦЕРИН

**Международное непатентованное наименование:** Глицерол

**Лекарственная форма:** раствор для местного и наружного применения

**Состав:**

*Действующее вещество:*

Глицерол (в пересчете на 100% вещество) - 860 г

*Вспомогательное вещество:*

Вода очищенная - до 1 кг.

**Описание:** Прозрачная, бесцветная сиропообразная жидкость без запаха. Гигроскопичен.

**Фармакотерапевтическая группа:** Дерматопротекторное средство.

**Код АТХ:** D02AX

**Фармакологические свойства**

Смягчает кожу и слизистые оболочки

**Показания:**

Сухость кожи и слизистых оболочек.

**Противопоказания:**

Гиперчувствительность, детский возраст до 1 года.

**С осторожностью**

При длительном применении глицерин может вызывать жжение, раздражение кожи и слизистых оболочек.

**Применение при беременности и в период грудного вскармливания:**

Глицерин может применяться при беременности и в период грудного вскармливания.

**Способ применения и дозы:**

Взрослые и дети с 1 года: смазывают пораженные участки кожи и слизистых оболочек по мере необходимости. Указание особенностей действия лекарственного препарата при первом приеме или при его отмене - нет сведений.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.12.2024 № 27421
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

**Побочное действие:**

По частоте возникновения нежелательные реакции классифицируются следующим образом: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100, но <1/10), нечасто (≥1/1 000, но <1/100), редко (≥1/10 000, но <1/1 000), очень редко (<1/10 000), частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно).

*Нарушения со стороны иммунной системы*

Аллергические реакции.

*Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей*

Раздражение (при длительном применении).

**Передозировка:**

Нет сведений.

**Взаимодействие с лекарственными препаратами:**

Нет сведений.

**Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Нет сведений.

**Форма выпуска:**

Раствор для местного и наружного применения.

По 25, 40, 50, 60, 70, 80, 100 г препарата во флаконы оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками или пробками с уплотнительными элементами полимерными или пробками полиэтиленовыми или пробками полиэтиленовыми «Топаз» и крышками полимерными или крышками полиэтиленовыми «Топаз», или укупоренными крышками полимерными или крышками полимерными (с уплотняющим элементом и палочкой кисти), или по 100 г во флаконы оранжевого стекла, укупоренные пробками полимерными с уплотнительными элементами, или пробками «заглушки» и крышками навинчиваемыми или крышками навинчиваемыми с пробкой пластмассовой или крышками навинчиваемыми с «прокладкой» пластмассовой или крышками полиэтиленовыми «Топаз», или колпачками алюминиевыми с прокладками или по 25, 40, 50, 60, 70, 80, 100 г во флаконы полимерные укупоренные пробками полимерными или пробками с уплотнительными элементами полимерными и крышками полимерными или укупоренные пробками полимерными и крышками полимерными или укупоренные крышками полимерными или крышками полимерными с уплотнительными элементами полимерными, или укупоренными крышками полимерными (с уплотняющим элементом и палочкой кисти) или крышками с поршнем для выдавливания, или во флаконы из полиэтилена высокого давления или низкого давления укупоренные пробками полимерными и крышками полимерными или крышками полимерными с

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.12.2024 № 27421
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

уплотнительными элементами полимерными.

Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона коробочного для потребительской тары или из картона макулатурного. Допускается укладка флаконов в групповую упаковку (коробку картонную) с равным количеством инструкций по применению.

По 5, 10, 20 кг в канистры из полиэтилена высокого давления или низкого давления.

**Условия хранения:**

Хранить при температуре не выше 30 ºС.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности:**

5 лет

Не использовать позже срока, указанного на упаковке.

**Условия отпуска:**

Отпускают без рецепта.

**Владелец регистрационного удостоверения:**

ООО «Женел РД», Россия, 249717, Калужская обл., Козельский район, с. Фроловское, ул. Православная, д. 70.

Тел.: (499) 647-55-77.

Эл. почта: genel.rd@mail.ru.

**Организация, принимающая претензии**:

АО «Самарамедпром», Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 12, помещ. 16Н/38.

Тел./факс: (846) 373-81-07, (846) 373-81-08.

Эл. почта: razvitie@samaramedprom.com.

**Производитель:**

АО «Самарамедпром», Россия, Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Ленина, зд. 99Б.

АО «Самарамедпром», Россия, Калужская обл., Козельский район, с. Фроловское, ул. Православная, д. 70.

Тел./факс: (846) 373-81-07, (846) 373-81-08.

Эл. почта: razvitie@samaramedprom.com.