ЛП-№(014574)-(РГ-RU) от 22.04.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 15.04.2026 № 7721
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ГЛИЦЕРИН

Регистрационный номер:

Торговое наименование: ГЛИЦЕРИН

Международное непатентованное или группировочное наименование: Глицерол

Лекарственная форма: суппозитории ректальные

Состав

1 суппозиторий содержит:

Действующее вещество		
Глицерол (в пересчете на 100 % вещество)	1,24 г	2,11 г
Вспомогательные вещества		
Макрогол 400 (полиэтиленоксид 400)	0,12 г	0,21 г
Стеариновая кислота	0,12 г	0,205 г
Натрия карбонат декагидрат	0,06 г	0,103 г

Описание: суппозитории прозрачные или полупрозрачные, почти бесцветные или с желтовато-коричневатым оттенком цвета, с мажущейся поверхностью, торпедообразной формы. Допускается равномерное помутнение суппозиториев, незначительное размягчение поверхностного слоя и подпотевание контурной упаковки. На срезе допускается наличие воздушного стержня или воронкообразного углубления.

Фармакотерапевтическая группа: средства для лечения запоров; другие средства для лечения запоров.

Код АТХ: A06AX01

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Слабительное средство.

При использовании в виде ректальных суппозиториев смягчает и смазывает затвердевшие фекальные массы, облегчает их прохождение по толстой кишке, оказывает раздражающее действие на слизистую оболочку кишечника, рефлекторно стимулируя моторику кишечника, инициирует процесс дефекации, облегчает прохождение и выведение каловых масс.

Фармакокинетика

Метаболизируется в печени.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 15.04.2026 № 7721
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Выводится через почки, в неизменном виде выделяется 7-14 %.

Показания к применению

Симптоматическое лечение запоров различной этиологии, когда применение пероральных слабительных препаратов невозможно.

Профилактика запоров у пациентов, которые не могут напрягаться при дефекации: болезненный тромбированный геморрой, трещины заднего прохода или перианальный абсцесс, аноректальный стеноз, после перенесенного инфаркта миокарда, после родов; перед и после хирургических операций на прямой кишке, перед инструментальным и рентгенологическим исследованиями прямой кишки.

Противопоказания

- Повышенная чувствительность к глицеролу или любому из компонентов препарата.
- Синдром раздраженного кишечника.
- Кишечная непроходимость.
- Аппендицит.
- Кровотечение.
- Диарея.
- Геморрой в стадии обострения.
- Трещины заднего прохода.
- Воспалительные заболевания и опухоли прямой кишки.
- Недиагностированная боль в животе.
- Геморрагический ректоколит.
- Беременность.
- Детский возраст до 5 лет.

С осторожностью

Почечная недостаточность, период грудного вскармливания.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Беременность

При беременности применение препарата противопоказано из-за возможной рефлекторной стимуляции матки.

Период грудного вскармливания

Неизвестно, проникает ли глицерол в грудное молоко, поэтому в период грудного вскармливания применение препарата возможно только в том случае, если, по мнению врача, ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Способ применения и дозы

Ректально.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 15.04.2026 № 7721
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Вводят препарат в прямую кишку и оставляют там не менее 5 минут. Обычно дефекация происходит через 5-10 минут после введения препарата. Остатки суппозитория выводятся из кишечника с калом.

Взрослые и дети старше 12 лет

Назначают по 1 суппозиторию, содержащему 2,11 г глицерола, 1 раз в сутки. При необходимости дозу повышают до 2 суппозиториев в сутки.

Дети от 5 до 12 лет

Назначают по 1 суппозиторию, содержащему 1,24 г глицерола, 1 раз в сутки.

Перед и после применения суппозиториев необходимо тщательно вымыть руки.

Не следует применять препарат более 7 дней.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции, местные реакции (зуд и жжение кожи), появление спастических болей в области кишечника. При длительном применении возможны явления раздражения прямой кишки, ослабление физиологического процесса дефекации.

При развитии побочных эффектов необходимо обратиться к врачу.

Передозировка

Симптомы

Частый жидкий стул.

Лечение

Отмена препарата, симптоматическое лечение.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Нет данных.

Особые указания

Систематический прием не рекомендуется. Лечение прекращают после восстановления нормальной перистальтики кишечника.

Не смазывать суппозитории минеральными жидкими или твердыми маслами.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Не установлено.

Форма выпуска

Суппозитории ректальные, 1,24 г, 2,11 г.

По 5 суппозиториев в контурную ячейковую упаковку из пленки ПВХ/ПЭ белой

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 15.04.2026 № 7721
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

комбинированной или из пленки поливинилхлоридной марки ЭП-73.

На контурную ячейковую упаковку допускается наклеивать этикетку из бумаги писчей или этикеточной, или самоклеящуюся этикетку.

По 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона. Пачки помещают в групповую упаковку.

Условия хранения

При температуре не выше 25 ºС.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения / Организация, принимающая претензии потребителей

Российская Федерация.

Акционерное общество «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод» (АО «Усолье-Сибирский химфармзавод»).

665452, Иркутская обл., г.о. город Усолье-Сибирское, тер. Промышленный массив, ул. Индустриальная, зд. 62.

Тел.: +7 (395) 435-89-08.

Электронная почта: usolpharm@usolpharm.ru

Производитель

Российская Федерация.

Акционерное общество «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод» (АО «Усолье-Сибирский химфармзавод»).

Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, тер. Промышленный массив, ул. Индустриальная, зд. 62.