ЛП-№(005236)-(РГ-RU) от 18.04.2024

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 22.01.2026 № 959
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Глицелакс®

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Глицелакс®

Международное непатентованное или группировочное наименование: Глицерол

Лекарственная форма: суппозитории ректальные

Состав

Один суппозиторий содержит:

Действующее вещество:		
Глицерол (Глицерин)	750 мг	1500 мг
Вспомогательные вещества:		
Магния карбонат гидрат (Магния карбонат основной)	25 мг	50 мг
Полисорбат-80 (Твин-80)	7 мг	14 мг
Моноглицериды дистиллированные (Палсгаард DMG 0093)	28 мг	56 мг
Жир твердый (Витепсол W 35)	590 мг	1180 мг

Описание

Суппозитории белого со слегка желтоватым оттенком цвета, без запаха, гигроскопичные, торпедообразной формы. Допускается незначительное размягчение поверхностного слоя и подпотевание поверхности суппозитория.

Фармакотерапевтическая группа: средства для лечения запоров; другие средства для лечения запоров

Код АТХ: A06AX01

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Слабительное средство.

При использовании в виде ректальных суппозиториев смягчает и смазывает затвердевшие фекальные массы, облегчает их прохождение по толстой кишке, оказывает раздражающее действие на слизистую оболочку кишечника, рефлекторно стимулируя моторику

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 22.01.2026 № 959
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

кишечника, инициирует процесс дефекации, облегчает прохождение и выведение каловых масс.

Фармакокинетика

Метаболизируется в печени. Выводится через почки, в неизменном виде выделяется 7-14%.

Показания к применению

Препарат показан к применению у взрослых и детей в возрасте с 3-х месяцев до 18 лет:

- для симптоматического лечения запоров различного происхождения;
- для профилактики запоров у пациентов, которые не могут напрягаться при дефекации: болезненный тромбированный геморрой, трещины заднего прохода или перианальный абсцесс, аноректальный стеноз, после перенесенного инфаркта миокарда, после родов;
- до и после хирургических операций на прямой кишке, перед инструментальным и рентгенологическим исследованием прямой кишки;
- при нарушении акта дефекации у детей с 3-х месячного возраста.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, геморрой в стадии обострения, воспалительные заболевания и опухоли прямой кишки, синдром раздраженного кишечника, кишечная непроходимость, аппендицит, кровотечение, диарея, не-диагностированная боль в животе, геморрагический ректоколит; детям до 3-х месячного возраста.

С осторожностью

Почечная недостаточность.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

В период беременности препарат можно использовать, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

В период грудного вскармливания применение лекарственного препарата возможно, если, по мнению врача, ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка, так как неизвестно, экскретируется ли глицерин в грудное молоко.

Способ применения и дозы

Ректально.

Препарат вводят в прямую кишку. Обычно дефекация происходит через 5-10 минут после введения средства. Остатки суппозитория выводятся из кишечника с калом.

Для детей с 3-х месячного возраста и старше в дозе 750 мг 1 раз в сутки.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 22.01.2026 № 959
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

Взрослым: в дозе 1500 мг 1 раз в сутки.

При необходимости дозу повышают до 2 суппозиториев в сутки.

До и после применения суппозиториев следует тщательно вымыть руки.

Не следует применять препарат более 7 дней без особых указаний врача.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции, местные реакции (зуд и жжение кожи), появление спастических болей в области кишечника. При длительном применении возможны явления раздражения прямой кишки, ослабление физиологического процесса дефекации.

При развитии побочных эффектов необходимо обратиться к врачу!

Передозировка

Симптомом передозировки является частый жидкий стул. В случае передозировки следует отменить препарат и проводить симптоматическое лечение.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Нет данных.

Особые указания

Систематический прием не рекомендуется. Лечение прекращают после восстановления нормальной перистальтики кишечника.

Не смазывать суппозитории минеральными жидкими или твердыми маслами.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не влияет на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

Форма выпуска

Суппозитории ректальные 750 мг и 1500 мг.

По 5 суппозиториев в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной (ПВХ) или пленки поливинилхлоридной и полиэтиленовой (ПВХ/ПЭ).

Две контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 22.01.2026 № 959
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения/Производитель/Организация, принимающая претензии от потребителей

Российская Федерация

ЗАО «Московская фармацевтическая фабрика» Россия

125239, г. Москва, Фармацевтический проезд, д. 1

тел. +7 (495) 956-05-71

www.mosfarma.ru