МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Глицериновые суппозитории

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Глицериновые суппозитории

Международное непатентованное или группировочное наименование: Глицерол

Лекарственная форма: суппозитории ректальные

Состав на один суппозиторий:

Действующее вещество:

Глицерол – 1405 мг; 2100 мг

Вспомогательные вещества:

Натрия стеарат - 95 мг; 140 мг

Вода очищенная - 80 мг; 120 мг

Описание

Суппозитории торпедообразной формы, полупрозрачные, почти бесцветные со слабым желтоватым оттенком, с маслянистой гладкой поверхностью, со слабым характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа: Слабительное средство.

Код АТХ: A06AX01.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Слабительное средство. При применении в виде ректальных суппозиториев смягчает и смазывает затвердевшие фекальные массы, облегчает их прохождение по толстой кишке, оказывает раздражающее действие на слизистую оболочку кишечника, рефлекторно стимулируя моторику кишечника, инициируют процесс дефекации, облегчает прохождение и выведение каловых масс.

Фармакокинетика

Хорошо всасывается через слизистую оболочку прямой кишки. Активно метаболизируется в печени. Выводится через почки, в неизменном виде выделяется 7-14%.

120758

Показания к применению

Симптоматическое лечение запоров различной этиологии (когда использование пероральных препаратов невозможно).

Профилактика запоров у пациентов, которые не могут напрягаться при дефекации: болезненный тромбированный геморрой, трещины заднего прохода или перианальный абсцесс, аноректальный стеноз, после перенесенного инфаркта миокарда, после родов; перед и после хирургических операций на прямой кишке; перед инструментальным и рентгенологическим исследованием прямой кишки.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к глицеролу или любому из компонентов препарата.

Синдром раздраженного кишечника, кишечная непроходимость, аппендицит, кровотечение, диарея, геморрой в стадии обострения, трещины заднего прохода, воспалительные заболевания и опухоли прямой кишки, недиагностированная боль в животе, геморрагический ректоколит, беременность, детский возраст до 5 лет.

С осторожностью

С осторожностью применять при почечной недостаточности, период грудного вскармливания.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания.

При беременности применение препарата противопоказано из-за возможной рефлекторной стимуляции матки.

Неизвестно, проникает ли глицерол в грудное молоко, поэтому данный лекарственный препарат в период грудного вскармливания применяется только в том случае, если, по мнению врача, ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка.

Способ применения и дозы

Ректально.

Препарат вводят в прямую кишку и оставляют там не менее 5 минут. Обычно дефекация происходит через 5–10 минут после введения средства. Остатки суппозитория выводятся из кишечника с калом.

Детям с 5 до 12 лет назначают по 1 суппозиторию, содержащему 1405 мг глицерола, 1 раз в сутки.

Детям старше 12 лет и взрослым назначают по 1 суппозиторию, содержащему 2100 мг глицерола, 1 раз в сутки. При необходимости дозу повышают до 2 суппозиториев в сутки.

120758

Максимальный курс лечения препаратом составляет не более 7 дней. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Аллергические реакции, местные реакции (зуд, жжение в области ануса), появление спастических болей в области кишечника. Проходит самостоятельно после отмены препарата

При длительном применении возможны явления раздражения прямой кишки, ослабление физиологического процесса дефекации.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Симптомом передозировки является частый жидкий стул. В случае передозировки следует отменить препарат. Симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Не описано.

Особые указания

С осторожностью применять препарат при почечной недостаточности.

Перед и после применения суппозиториев следует тщательно вымыть руки.

Систематическое применение не рекомендуется. Лечение прекращают после восстановления нормальной перистальтики кишечника. Не следует применять суппозитории более 7 дней.

Не смазывать суппозитории минеральными жидкими или твердыми маслами.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Не установлено.

Форма выпуска

Суппозитории ректальные 1405 мг и 2100 мг.

Первичная упаковка

По 6 суппозиториев в контурную ячейковую упаковку из алюминиевой фольги, дублированной полиэтиленовой пленкой (стрип).

120758

Вторичная упаковка

По 1 или 2 контурных ячейковых упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению в пачку из картона.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель

Антибиотиче С.А.

ул. Валя Лупулуй 1, 707410, Яссы, Румыния

Тел..: +40 232 209 000, +40 372 065 000

Адрес места производства

Антибиотиче С.А.

ул. Валя Лупулуй 1, 707410, Яссы, Румыния

Владелец регистрационного удостоверения/Организация, принимающая претензии потребителей:

ОАО «Бофарм»

Российская Федерация, 123182, г. Москва, а/я 4.

Тел.: +7 (495) 942-5327

Генеральный директор

ОАО «Бофарм» В. Волошин

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Бофарм"

ФГБУ НЦЭСМП ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

120758