МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП-000321-200516
СОГЛАСОВАНО

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Дексерил®

(наименование лекарственного препарата)

Регистрационный номер:

Торговое название: Дексерил®

Международное непатентованное название: глицерол

Лекарственная форма: крем для наружного применения

Состав (на 100 г крема):

Активное вещество: глицерол – 15,00 г.

Вспомогательные вещества: вазелин - 8,00 г; парафин жидкий - 2,00 г; глицерил моностеарат - 5,00 г; кислота стеариновая - 3,00 г; циклометикон - 2,50 г; диметикон - 0,50 г; макрогол 600 - 5,00 г; троламин - 0,50 г; пропилпарагидроксибензоат - 0,10 г, вода очищенная до 100 г.

Описание

Маслянистый белый крем.

Фармакотерапевтическая группа: дерматопротекторное средство.

Код АТХ: [D11AX]

Фармакологические свойства

Препарат обладает смягчающим действием при чрезмерной сухости кожи.

Показания к применению

Сухость кожи при определенных типах дерматозов, таких как атопический дерматит, ихтиоз и псориаз (в комплексной терапии).

Поверхностные ожоги, затрагивающие малые участки поверхности кожи (в комплексной терапии).

В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Возможно применение при беременности.

Не рекомендуется применение препарата на коже груди в период кормления грудью.

Способ применения и дозы

Наружно.

Наносят тонкий слой крема на пораженные участки кожи 1-2 раза в день или чаще, если это необходимо.

Если после лечения улучшения не наступает или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Ввиду наличия в составе препарата пропилпарагидроксибензоата возможны (редко) кожные аллергические реакции, такие как экзема или в отдельных случаях возможно развитие крапивницы.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или отмечаются любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, следует немедленно сообщить об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени ни об одном случае передозировки препарата Дексерил не сообщалось.

При случайном, неправильном применении препарата внутрь, в частности детьми, возможно возникновение следующих симптомов: легкая диарея и рвота. Симптомы быстро проходят и не требуют медикаментозной коррекции.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Не выявлено.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат Дексерил не влияет на способность управлять автомобилем и другими механическими средствами.

Форма выпуска

Крем для наружного применения 15 %.

По 50 или 250 г препарата в тубу из полиэтилена с завинчивающейся полипропиленовой крышкой.

Каждую тубу вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

Условия хранения

При температуре не выше 30 °С.

В недоступном для детей месте!

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности!

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Наименование и адрес юридического лица,
на имя которого выдано регистрационное удостоверение

«Пьер Фабр Дерматология», Франция

Плас Абель Ганс, 45, 92100 Булонь, Франция

Наименование и адрес производителя лекарственного препарата

«Пьер Фабр Медикамент Продакшн», Франция

Юридический адрес: Плас Абель Ганс, 45, 92100 Булонь, Франция

Фактический адрес: Предприятие Прогифарм, Рю дю Лисе,

Зон Индустриель де Куири 45500 Жиен, Франция

Наименование и адрес организации для приема претензий

ООО «Пьер Фабр»

119435, Москва, Саввинская наб., д. 15

Тел.: +7(495) 789-95-33

Факс: +7(495) 789-95-34

e-mail: info.pfrussia@pierre-fabre.com

Представитель фирмы Иванова Н. К.