МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП-000321-210119
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

ДЕКСЕРИЛ®

наименование лекарственного препарата

Крем для наружного применения 15%

лекарственная форма, дозировка

Пьер Фабр Медикамент Продакшн, Франция

наименование производителя, страна

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «____» 210119 2018 г.

Старая редакция	Новая редакция
Фармакотерапевтическая группа: дерматопротекторное средство. **Код АТХ: [D11AX]** **Фармакологические свойства** Препарат обладает смягчающим действием при чрезмерной сухости кожи.	**Фармакотерапевтическая группа:** дерматопротекторное средство. **Код АТХ: [D02AC]** **Фармакологические свойства** Препарат обладает смягчающим и увлажняющим действием при чрезмерной сухости кожи. Препарат имеет следующие механизмы действия: - Снижение трансэпидермальной потери влаги: вазелин и парафин образуют липидный слой, предотвращающий потерю влаги из рогового слоя кожи, и позволяют сохранять в нем водорастворимые и гигроскопичные вещества.

	- Повышенное увлажнение поверхностных слоев кожи благодаря гигроскопичности глицерола и его способности проникать в эпидермис. В тестах *ex vivo* на обезжиренных имплантатах тканей также было продемонстрировано защитное действие в отношении кожи. Эти тесты показали быстрое реструктурирование липидного барьера и смягчающее действие препарата ДЕКСЕРИЛ, включая восстановление гомеостаза в корнеодесмосомных соединениях. Эти свойства, продемонстрированные в клинических фармакологических исследованиях на валидированных моделях, обеспечивают восстановление уровня увлажненности и барьерной функции кожи, уменьшая раздражение и зуд.
Применение при беременности и в период грудного вскармливания Возможно применение при беременности. Не рекомендуется применение	**Применение при беременности и в период грудного вскармливания** Возможно применение при беременности. Не рекомендуется применение

препарата на коже груди в период кормления грудью. - **Побочное действие** Ввиду наличия в составе препарата пропилпарагидроксибензоата возможны (редко) кожные аллергические реакции, такие как экзема или в отдельных случаях возможно развитие крапивницы. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или отмечаются любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, следует немедленно сообщить об этом врачу.	препарата на коже груди в период кормления грудью. <u>Фертильность</u> Не оказывает влияния на репродуктивную функцию, поскольку системное действие глицерола, вазелина и парафина незначительное. **Побочное действие** Побочные реакции систематизированы по системно-органным классам и перечислены в соответствии со следующей градацией: очень часто (≥ 1/10), часто (≥ 1/100 до < 1/10), нечасто (≥ 1/1000 до < 1/100), редко (≥ 1/10000 до < 1/1000), очень редко (< 1/10000) частота неизвестна (не может быть оценена по имеющимся данным). *Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей* нечасто: крапивница, дерматит, экзема, эритема, зуд, сыпь; частота неизвестна: ощущение жжения на коже. *Общие расстройства и нарушения в месте введения:*

	нечасто: реакция в месте нанесения (раздражение, покраснение, зудящая боль); частота неизвестна: экзема в месте нанесения. **Особые указания** Не используйте препарат внутрь. Не наносите препарат на инфицированные участки кожи или под окклюзионную повязку. Из-за наличия в составе препарата пропилпарагидроксибензоата возможны аллергические реакции (в том числе, реакции замедленного типа).

Представитель фирмы Иванова Н.К.