

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА**

Глутаминовая кислота

Регистрационный номер:

Торговое название препарата: Глутаминовая кислота

Международное непатентованное название: Глутаминовая кислота

Лекарственная форма: таблетки покрытые оболочкой

Состав на одну таблетку:

активное вещество: глутаминовая кислота – 0,25 г.

Вспомогательные вещества ядра: крахмал картофельный – 0,0281 г, повидон (коллидон 30, пласдон К-29/32) – 0,0084 г, тальк – 0,006 г, кальция стеарата моногидрат – 0,0024 г.

Вспомогательные вещества оболочки: сахароза (сахар) – 0,089305 г, тальк – 0,003933 г, титана диоксид (диоксид титана) – 0,002573 г, повидон (поливинилпирролидон, пласдон К-17) – 0,002018 г, кремния диоксид коллоидный (аэросил) – 0,002115 г, воск пчелиный – 0,000028 г, парафин жидкий (вазелиновое масло) – 0,000028 г.

Описание: круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые оболочкой, белого или белого с едва заметным желтоватым оттенком цвета. На поперечном разрезе видны два слоя.

Фармакотерапевтическая группа: ноотропное средство.

Код АТХ: [N06BX]

Фармакологические свойства

Фармакологическое действие. Глутаминовая кислота участвует в синтезе белка (заменимая аминокислота) и является нейромедиатором глутаминовых рецепторов.

Фармакокинетика. Пресистемному метаболизму подвергается 95 % принимаемой внутрь глутаминовой кислоты, как и прочие аминокислоты, не накапливается, полностью включается в пул глутаминовой кислоты организма.

Показания к применению

Восполнение дефицита глутаминовой кислоты.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата, лихорадочный синдром, печеночная и/или почечная недостаточность, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, анемия, лейкопения; повышенная возбудимость, бурно протекающие психотические реакции; нефротический синдром; угнетение костномозгового кроветворения; ожирение; дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция. Детский возраст до 18 лет.

С осторожностью

Заболевания печени.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применять по рекомендации врача.

Применение препарата возможно, если ожидаемая польза превышает риск для плода и ребенка.

Способ применения и дозы

Внутрь, за 15-30 мин до еды (при развитии диспепсии - во время или после еды).

Взрослым – по 1 г 2-3 раза в день. Курс лечения – от 1-2 до 6-12 месяцев.

Побочное действие

Аллергические реакции, рвота, диарея, боль в животе, тошнота, повышенная возбудимость. При длительном применении - анемия, лейкопения, раздражение слизистой оболочки полости рта, трещины на губах.

Передозировка

При передозировке усиливаются дозозависимые нежелательные лекарственные реакции, так как аллергические реакции, описанные в разделе «Побочное действие», носят дозозависимый характер.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

При миопатии и мышечной дистрофии глутаминовая кислота более эффективна в соединении с пахикарпином или гликоколом.

Особые указания

В период лечения необходимо регулярно проводить общеклинические анализы кро-

ви и мочи. При возникновении побочных реакций рекомендуется снизить дозу глутаминовой кислоты.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Прием глутаминовой кислоты не влияет на способность к управлению автотранспортом или иными механизмами в период применения.

Форма выпуска

Таблетки покрытые оболочкой 250 мг.

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой.

По 60 таблеток в банку из полимерных материалов.

Каждую банку или 6 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

Отпускают без рецепта.

Производитель и предприятие для принятия претензий

ОАО «Марбиофарм»,

424006, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, 121,

тел.: (8362) 42-03-12, факс: (8362) 45-00-00

Генеральный директор

ОАО «Марбиофарм»



Д.В. Болдов

