

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Глутаминовая кислота

таблетки, покрытые оболочкой 250 мг

ОАО «Марбиофарм», Россия

Изменение № 1

131219

Дата внесения Изменения «_____» _____ 20____ г.


Старая редакция	Новая редакция
Фармакотерапевтическая группа: ноотропное средство. Код АТХ: [N06BX] Показания к применению Восполнение дефицита глутаминовой кислоты. Противопоказания Гиперчувствительность к компонентам препарата, лихорадочный синдром, печеночная и/или почечная недостаточность, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, анемия, лейкопения; повышенная возбудимость, бурно протекающие психотические реакции; нефротический синдром; угнетение костномозгового кроветворения; ожирение; дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция. Детский возраст до 18 лет.	Фармакотерапевтическая группа: аминокислоты и их производные. Код АТХ: A16AA Показания к применению Состояния, сопровождающиеся дефицитом глутаминовой кислоты. Противопоказания Гиперчувствительность к компонентам препарата, лихорадочный синдром, печеночная и/или почечная недостаточность, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, анемия, лейкопения; повышенная нервная возбудимость, острые психотические реакции; нефротический синдром; угнетение костномозгового кроветворения; ожирение; детский возраст до 18 лет; дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

121360

Старая редакция	Новая редакция
Способ применения и дозы Внутрь, за 15-30 мин до еды (при развитии диспепсии - во время или после еды). Взрослым – по 1 г 2-3 раза в день. Курс лечения – от 1-2 до 6-12 месяцев.	Способ применения и дозы <i>Взрослым.</i> Внутрь, за 15-30 мин до еды (при развитии диспепсии - во время или после еды) по 1 г 2-3 раза в день. Курс лечения устанавливается индивидуально. Если после лечения улучшения не наступает или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.
Побочное действие Аллергические реакции, рвота, диарея, боль в животе, тошнота, повышенная возбудимость. При длительном применении - анемия, лейкопения, раздражение слизистой оболочки полости рта, трещины на губах.	Побочное действие <i>Нарушения со стороны крови и лимфатической системы:</i> при длительном применении - анемия, лейкопения. <i>Нарушения со стороны иммунной системы:</i> аллергические реакции. <i>Нарушения со стороны нервной системы:</i> повышенная возбудимость. <i>Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта:</i> рвота, диарея, боль в животе, тошнота. <i>Прочие:</i> при длительном применении

Старая редакция	Новая редакция
Передозировка При передозировке усиливаются дозозависимые нежелательные лекарственные реакции, так как аллергические реакции, описанные в разделе «Побочное действие», носят дозозависимый характер. Взаимодействие с другими лекарственными препаратами При миопатии и мышечной дистрофии глутаминовая кислота более эффективна в соединении с пахикарпином или гликоколом. Особые указания В период лечения необходимо регулярно проводить общеклинические анализы крови и мочи. При возникновении побочных реакций рекомендуется сни-	раздражение слизистой оболочки полости рта, трещины на губах. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу. Передозировка <i>Симптомы.</i> При передозировке усиливаются дозозависимые нежелательные реакции. Аллергические реакции, описанные в разделе «Побочное действие», носят дозозависимый характер. <i>Лечение:</i> Первая помощь заключается в промывании желудка, приеме активированного угля. При необходимости – симптоматическая терапия. Взаимодействие с другими лекарственными средствами Фармакокинетическое и фармакодинамическое взаимодействие не установлено. Особые указания В период лечения необходимо регулярно проводить общеклинические анализы крови и мочи. При возникновении дозозависимых побочных

Старая редакция	Новая редакция
зить дозу глутаминовой кислоты. Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами Прием глутаминовой кислоты не влияет на способность к управлению автомобилем или иными механизмами в период применения.	реакций рекомендуется снизить дозу глутаминовой кислоты. Внимательно прочтите инструкцию перед тем, как начать применение препарата. Сохраните инструкцию, она может понадобиться вновь. Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу. Лекарственное средство, которым Вы лечитесь, предназначено лично Вам и его не следует передавать другим лицам, поскольку оно может причинить им вред даже при наличии тех же симптомов, что и у Вас. Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами Не изучалось.



Генеральный директор
ОАО «Марбиофарм»



М.А. Толмачев