МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП 000043 - 191115
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

ХОНДРОГЛЮКСИД

Регистрационный номер: ЛП-000043

Торговое наименование: Хондроглюксид

Международное непатентованное или группировочное наименование: Глюкозамин+Хондроитина сульфат&

Лекарственная форма: гель для наружного применения

Состав:

Активные вещества: хондроитина сульфат натрия - 5,0 г, глюкозамина сульфата натрия хлорид (в пересчете на глюкозамина сульфат) - 2,5 г.

Вспомогательные вещества: натрия дисульфит (натрия метабисульфит) - 0,05 г, этанол 96 % (спирт этиловый ректификованный 96 %) - 25,0 г, пропиленгликоль - 10,0 г, карбомер (карбопол) - 3,0 г, метилпарагидроксибензоат (нипагин, метилпарабен) - 0,2 г, лаванды масло - 0,05 г, вода очищенная - до 100 г.

Описание:

Бесцветный или с желтоватым оттенком гель со специфическим запахом.

Фармакотерапевтическая группа: репарации тканей стимулятор

Код АТХ: [M02AX10]

Фармакологическое действие

Стимулирует регенерацию хрящевой ткани, оказывает противовоспалительное и обезболивающее действие. Глюкозамин и хондроитина сульфат принимают участие в синтезе соединительной ткани, способствуя предотвращению процессов разрушения хряща и стимулируя регенерацию ткани.

Глюкозамин обладает хондропротекторными свойствами, принимает участие в биосинтезе протеогликанов и гиалуроновой кислоты. Глюкозамин селективно действует на суставной хрящ, является специфическим субстратом и стимулятором синтеза гиалуроновой кислоты и протеогликанов, угнетает образование перекисных радикалов и ферментов, повреждающих хрящевую ткань (коллагеназы и фосфолипазы).

Хондроитина сульфат стимулирует образование компонентов суставных хрящей, синтез

протеогликанов и коллагена II типа, а также защищают гиалурон от ферментативного расщепления (путем подавления активности гиалуронидазы) и от повреждающего действия свободных радикалов. Хондроитина сульфат поддерживает вязкость синовиальной жидкости, стимулирует механизмы репарации хряща и подавляет активность тех ферментов (эластаза, гиалуронидаза), которые расщепляют хрящ. Хондроитина сульфат при лечении остеоартроза облегчает симптомы этого заболевания и уменьшает потребность в нестероидных противовоспалительных препаратах (НПВП).

Показания к применению

Остеоартроз (в том числе суставов и позвоночника I-III ст.).

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, повреждение целостности кожных покровов в месте нанесения препарата, детский возраст до 18 лет, беременность, период грудного вскармливания.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Не рекомендуется применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания, в связи с отсутствием данных о безопасности применения препарата у данной категории пациентов.

Способ применения и дозы

Наружно. Гель наносят 2-3 раза в сутки тонким слоем полоской 4 см (2 г) на неповрежденную кожу над участком поражения, затем втирают до впитывания в течение 2-3 мин. Длительность применения препарата - 1 мес. Возможно проведение повторного курса по рекомендации врача.

Побочное действие

Аллергические реакции.

Если Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Данные отсутствуют.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Данные отсутствуют.

Особые указания

Только для наружного применения. Препарат следует наносить только на неповрежденные участки кожи, избегая попадания на открытые раны, в глаза и на слизистые оболочки.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска

Гель для наружного применения 5,0 г + 2,5 г.

По 30 г, 50 г, 100 г в тубы алюминиевые.

По 30 г, 50 г, 100 г в тубы ламинатные с навинченными полимерными бушонами.

Каждая туба с инструкцией по медицинскому применению в пачке из картона.

Срок годности

3 года.

Не использовать препарат после истечения срока годности.

Условия хранения

В защищённом от света месте при температуре не выше 25 °С. Не замораживать.

Хранить в местах, недоступных для детей.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта

Владелец регистрационного удостоверения / Производитель / Организация, принимающая претензии:

Открытое акционерное общество «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез» (ОАО «Синтез»)

640008, Россия, г. Курган, проспект Конституции,7,

Телефон/факс (3522) 48-16-89,

e-mail ontir@kurgansintez.ru,

Интернет–сайт предприятия: http://www.kurgansintez.ru

Представитель фирмы В.И. Петухов