

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО
ПРЕПАРАТА

Гопантомид®

наименование лекарственного препарата

раствор для приема внутрь, 100 мг/мл

лекарственная форма, дозировка

**АО «Усолъе-Сибирский химфармзавод»
665462, Иркутская область, г. Усолъе-Сибирское**

наименование юридического лица, адрес

Изменение № 1

Дата внесения изменения с " _____ " **24 05 22** г.

Старая редакция	Новая редакция
1	2
Фармакотерапевтическая группа: ноотропное средство	Фармакотерапевтическая группа: ноотропное средство
Побочное действие Возможны аллергические реакции (ринит, конъюнктивит, кожные аллергические реакции). В этом случае уменьшают дозу препарата или отменяют препарат. Нарушения сна или сонливость, шум в голове — обычно кратковременны и не	Побочное действие Возможны аллергические реакции (ринит, конъюнктивит, кожные аллергические реакции). В этом случае уменьшают дозу препарата или отменяют препарат. Нарушения сна или сонливость, шум в голове —

требуют отмены препарата.	обычно кратковременны и не требуют отмены препарата.
---------------------------	--

Генеральный директор
АО «Усолъе-Сибирский
химфармзавод»



С.В. Тюстин