

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

АДОНИС-БРОМ

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Адонис-бром

Международное непатентованное или группировочное наименование: Горицвета
весеннего травы экстракт+Калия бромид

Лекарственная форма: таблетки, покрытые оболочкой

Состав на одну таблетку

Активные компоненты

Горицвета экстракт густой с содержанием суммы сердечных гликозидов в пересчете на цимарин и абсолютно сухое вещество 0,56 %	— 0,06907 г
--	-------------

Калия бромид	— 0,25 г
--------------	----------

Вспомогательные вещества ядра

Крахмал картофельный	— 0,07437 г
Магния карбонат основной (магния гидроксикарбонат)	— 0,01204 г
Тальк	— 0,00909 г
Кальция стеарат	— 0,00270 г

Вспомогательные вещества оболочки

Сахар (сахароза)	— 0,18930 г
Магния карбонат основной (магния гидроксикарбонат)	— 0,10403 г
Тальк	— 0,01131 г
Аэросил (кремния диоксид коллоидный)	— 0,00602 г
Титана диоксид	— 0,00602 г
Желатин	— 0,00294 г
Вазелиновое масло (парафин жидкий)	— 0,00019 г
Воск пчелиный	— 0,00019 г

Описание

Таблетки круглые двояковыпуклой формы, покрытые оболочкой, белого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Средства для лечения заболеваний сердца; сердечные гликозиды; другие сердечные гликозиды.

Код АТХ

C01AX.

Фармакологические свойства

Оказывает седативное, а также умеренное кардиотоническое действие.

Фармакокинетика

Данные отсутствуют.

Показания к применению

Невротический синдром, в том числе сопровождающийся тахикардией.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; выраженная брадикардия, атриовентрикулярная блокада различной степени, синдром Морганьи-Адамса-Стокса, стенокардия; эрозии, язвы пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки; дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, возраст до 18 лет.

С осторожностью

Сахарный диабет. Лицам, находящимся на диете с пониженным содержанием углеводов; лицам со сниженной функцией почек, и находящимся на диете с низким содержанием калия.

Если у Вас одно из перечисленных заболеваний или состояний, перед приемом препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Не рекомендуется применять при беременности и в период грудного вскармливания в связи с отсутствием специальных данных о безопасности применения у данной категории пациентов.

Способ применения и дозы

Внутрь, по 1 таблетке 3 раза в день после еды. Курс лечения 25-30 дней. Целесообразность проведения повторных курсов определяется врачом.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции, тошнота, рвота; при длительном применении – кашель, насморк, апатия, общая слабость, нарушение восприятия, ослабление памяти, кожная сыпь, конъюнктивит.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Симптомы передозировки бромидами: кашель, насморк, апатия, головная боль, общая слабость, нарушение восприятия, ослабление памяти, кожная сыпь, конъюнктивит. В этих случаях необходимо прекращение приема препарата, введение больших количеств (при отсутствии противопоказаний) натрия хлорида – 10-20 г в сутки (ускоряет выведение брома) в сочетании с обильным питьем (3-5 литров в сутки).

Симптомы передозировки сердечными гликозидами: выраженная брадикардия, политопная экстрасистолия, бигеминия или тригеминия, замедление предсердно-желудочковой проводимости; в тяжелых случаях – трепетание желудочков и остановка сердца. При интоксикации, связанной с передозировкой препаратов сердечных

гликозидов, делают перерыв в их применении, при необходимости назначают препараты калия и антиаритмические средства.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Препарат усиливает действие снотворных средств и других лекарственных препаратов, угнетающих центральную нервную систему, что требует коррекции доз при одновременном применении.

Если Вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные) перед применением препарата Адонис-Бром проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

Пациентам с сахарным диабетом необходимо учитывать, что в одной таблетке препарата содержится около 0,264 г углеводов (0,022 ХЕ).

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

В период применения препарата необходимо соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Форма выпуска

Таблетки, покрытые оболочкой. По 10 или 20 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной. 2 контурные ячейковые упаковки по 10 таблеток или 1 контурную ячейковую упаковку по 20 таблеток вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

**Держатель регистрационного удостоверения/Производитель/Организация,
принимаящая претензии потребителей**

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

142279, Московская обл., г. Серпухов, п. Оболенск, ГНЦ ПМ.

Тел.: (495) 716-15-81, 716-15-90.