

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Горца птичьего (спорыша) трава
(*Polygoni avicularis herba*)

Регистрационный номер

Торговое наименование. Горца птичьего (спорыша) трава.

Международное непатентованное или группировочное наименование. Горца птичьего трава.

Лекарственная форма. Трава измельченная.

Состав. Трава горца птичьего (спорыша).

Характеристика.

Трава горца птичьего (спорыша) содержит флавоноиды, кремниевую кислоту, аскорбиновую кислоту, витамин К, дубильные вещества и другие биологически активные вещества.

Описание.

Кусочки стеблей, листьев и цветков, иногда корней различной формы, а также отдельные семена. Цвет серовато-зеленый с беловатыми, светло-коричневыми, коричневыми и редкими темно-коричневыми или черными вкраплениями. Запах слабый. Вкус водного извлечения слегка вяжущий.

Фармакотерапевтическая группа.

Диуретическое средство растительного происхождения.

Фармакологическое действие.

Настой травы горца птичьего (спорыша) препятствует образованию мочевых камней (уратов); оказывает диуретическое, противовоспалительное, гемостатическое, умеренное противомикробное действие, повышает сократительную активность матки.

Показания к применению.

Мочекаменная болезнь (в качестве средства, способствующего отхождению мелких конкрементов).

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к препарату; повышенная свертываемость крови, беременность, детский возраст до 12 лет. Наличие в мочевыводящих путях камней размером более 6 мм.

С осторожностью.

Тромбофлебит в анамнезе.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания.

Противопоказано применение препарата при беременности. Применение в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы.

Около 15 г (3 столовые ложки) травы горца птичьего (спорыша) помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, накрывают крышкой, нагревают на кипящей водяной бане 15 минут, охлаждают при комнатной температуре 45 минут, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Настой принимают внутрь по 1/2-1/3 стакана 2-3 раза в день до еды. Курс лечения 20-25 дней. Повторные курсы лечения (не более четырех в год) возможны через 10-12 дней, после консультации с врачом.

Перед применением настой рекомендуется взбалтывать.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие.

Возможны аллергические реакции, почечная колика, повышение свертываемости крови.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка.

Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами.

Не описано.

Особые указания.

Если при применении препарата симптомы сохраняются без улучшения более 2 недель или ухудшаются, следует обратиться к врачу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска.

Трава измельченная. По 30 г, 35 г, 40 г, 50 г, 60 г, 75 г, 100 г травы измельченной в пачках из картона с контролем первого вскрытия с внутренним пакетом из бумаги с термосвариваемым полипропиленовым слоем или бумаги с термосвариваемым полиэтиленовым слоем, или материала комбинированного многослойного, или полипропилена.

Инструкция по применению вкладывается в пачку или текст инструкции по применению наносится на пачку.

Условия хранения.

В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С; приготовленный настой – в прохладном месте не более 2-х суток.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности.

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска.

Отпускают без рецепта.

Производитель / Держатель регистрационного удостоверения / Организация, принимающая претензии

АО «Красногорсклексредства»

Россия, 143444, Московская обл., г. Красногорск, ул. Мира (Опалиха мкр.), д. 25

Тел.: +7 (495) 705-93-80 • Факс: +7 (495) 705-93-82 • krls@krls.ru

Адрес производственной площадки (выпускающий контроль качества): Россия, Московская обл., г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Мира, д. 25