

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ЭФФЕКС® Красный корень

Регистрационный номер:

Торговое наименование: ЭФФЕКС® Красный корень

Международное непатентованное или группировочное наименование: Горца птичьего травы + Копеечника забытого корневищ с корнями настойка

Лекарственная форма: настойка

Для получения настойки используют

Активные компоненты: копеечника забытого корневища и корни – 70 г, горца птичьего трава – 30 г.

Вспомогательное вещество: этанол (спирт этиловый) 40 % - достаточное количество для получения 1000 мл настойки.

Описание

Прозрачная жидкость красно-коричневого цвета с характерным запахом. При хранении допускается опалесценция и выпадение осадка.

Фармакотерапевтическая группа

Средство лечения хронического простатита растительного происхождения.

Код АТХ: G04BX

Фармакологические свойства

Оказывает противовоспалительное и противоотечное действие, снижает выраженность болевого синдрома, улучшает уродинамику мочевыводящих путей и микроциркуляцию в предстательной железе.

Показания к применению

Хронический абактериальный простатит в составе комплексной терапии.

Противопоказания

Индивидуальная гиперчувствительность к компонентам, входящим в состав препарата, тромбофлебит в анамнезе, заболевания печени, выраженные нарушения функции почек. Алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, возраст до 18 лет (из-за наличия в составе этанола).

С осторожностью применять пациентам с нарушением функции почек легкой и средней степени тяжести.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Препарат не предназначен для применения у женщин.

Способ применения и дозы

Внутрь: по 1 чайной ложке настойки, разведенной в 1/3 стакана воды, за 30 мин до еды 3 раза в день. Курс лечения – 4 недели.

При необходимости курс лечения можно повторить после согласования с врачом.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции.

При появлении побочных эффектов, в том числе не указанных в инструкции, следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Передозировка

До настоящего времени о случаях передозировки препарата не сообщалось.

При применении препарата в дозах, превышающих рекомендуемые, возможны признаки алкогольной интоксикации (головокружение, тошнота, рвота). Лечение симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

В настоящее время не установлено клинически значимых взаимодействий препарата при совместном применении его с другими лекарственными средствами. Возможно применение препарата одновременно с антибактериальными средствами.

Особые указания

Перед тем как начать прием препарата, следует проконсультироваться с лечащим врачом.

Если на фоне приема препарата в течение двух недель сохраняется выраженность клинических симптомов заболевания, или состояние ухудшается, следует обратиться к лечащему врачу.

В период приема препарата рекомендуется посещение врача с целью коррекции терапии в случае необходимости. Кратность и сроки посещения определяются лечащим врачом.

Увеличение рекомендуемой разовой дозы препарата не приводит к повышению его эффективности.

Содержание этанола в препарате составляет не менее 35 %. Разовая доза препарата (1 чайная ложка) содержит 1,58 г абсолютного этилового спирта, максимальная суточная доза (3 чайные ложки) содержит 4,74 г абсолютного этилового спирта.

Не рекомендуется превышать указанную суточную дозу.

При хранении препарата возможно выпадение осадка, что не влияет на эффективность и качество препарата. Перед применением взбалтывать.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

В период лечения препаратом следует воздержаться от выполнения потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Форма выпуска

Настойка. По 50, 100 мл во флаконы из коричневого или оранжевого стекла для лекарственных средств, укупоренные крышками навинчиваемыми с уплотняющим элементом и контролем первого вскрытия или укупоренные капельницами и крышками навинчиваемыми с контролем первого вскрытия. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускается без рецепта.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 18.04.2025 № 10469
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

**Владелец регистрационного удостоверения / Производитель / Организация,
принимающая претензии от потребителей**

ЗАО «Эвалар», Россия, 659332, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6,
тел. (3854) 39-00-50, 8-800-200-52-52, www.evalar.ru.