

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ЧАГИ НАСТОЙКА

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Чаги настойка

Международное непатентованное или группировочное наименование: гриба
березового настойка

Лекарственная форма: настойка

Состав:

Для получения настойки используют: чаги – 100 г, этанола (спирта этилового) 70 % –
достаточное количество для получения 1000 мл.

Описание: прозрачная жидкость желтовато-коричневого цвета. При хранении настойки
возможно выпадение осадка.

Фармакотерапевтическая группа: прочие препараты; другие лечебные средства; прочие
лечебные средства.

Код АТХ: V03AX

Фармакологические свойства

Действие препарата определяется эффектом входящих в его состав биологически
активных веществ (гуминоподобной чаговой кислоты, органических кислот,
микроэлементов, в т.ч. марганца и кобальта, пигментов и других соединений). Препарат
регулирует метаболические процессы, способствует повышению общей резистентности
организма, снижает потоотделение, нормализует функцию кишечника, устраняет
диспептические явления, оказывает общетонизирующее действие.

Показания к применению

Препарат Чаги настойка показан к применению у взрослых в составе комплексной
терапии хронического гастрита, язвенной болезни желудка вне обострения, дискинезии
желудочно-кишечного тракта с явлениями атонии. В качестве симптоматического
средства, улучшающего общее состояние пациентов со злокачественными
новообразованиями различной этиологии.

Противопоказания

- повышенная чувствительность к действующему веществу (чаге) или к любому из вспомогательных веществ;
- беременность, период грудного вскармливания;
- возраст от 0 до 18 лет.

С осторожностью

Заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, эпилепсия.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Способ применения и дозы

Внутрь.

По 20-30 капель 2-3 раза в день за 30 минут до еды с небольшим количеством воды.

Курс лечения 3-5 месяцев. Проведение повторного курса лечения возможно после консультации с врачом.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции; при длительном применении - диспепсические явления, повышенная возбудимость, вегетативная лабильность.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не рекомендуется одновременное назначение пенициллина и внутривенное введение

декстрозы (глюкозы).

Особые указания

Лекарственный препарат Чаги настойки содержит этанол (спирт этиловый) 70%. Максимальная разовая доза препарата содержит 0,33 г абсолютного этилового спирта, максимальная суточная доза препарата содержит 0,99 г абсолютного этилового спирта. При лечении препаратами чаги показана молочно-растительная диета, ограничение в рационе питания жиров и мяса, исключение копченостей, острых приправ, консервов.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

В период применения препарата Чаги настойка необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и занятиях другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Настойка.

По 25 мл препарата во флакон темного стекла, укупоренный пробкой или пробкой-капельницей из полиэтилена (высокого давления) или полипропилена с пластиковой крышкой навинчиваемой или навинчиваемой с контролем первого вскрытия, также допускается использование крышки или крышки-капельницы без пробки.

На флаконы наклеивают этикетку из бумаги или самоклеящуюся этикетку.

Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Допускается вложение полимерной ложки мерной в каждую пачку.

По 10, 16, 20, 30, 40, 56, 112 флаконов по 25 мл с равным количеством инструкций по медицинскому применению помещают в коробку картонную или ящик из гофрированного картона (для стационаров).

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре от 8 до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения

АО «Кировская фармацевтическая фабрика»

Россия, 610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, д. 27 а

Производитель

АО «Кировская фармацевтическая фабрика»

Россия, 610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, д. 27 а

Организация, принимающая претензии потребителей

АО «Кировская фармацевтическая фабрика»

Россия, 610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, д. 27 а

Тел./факс (8332) 65-46-64, 65-35-10

E-mail: kachestvo-s@k-ff.ru