

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Бефунгин

Регистрационный номер:

Торговое наименование

Бефунгин

Международное непатентованное или группировочное наименование

Гриба березового экстракт + Кобальта хлорид

Лекарственная форма

Концентрат для приготовления раствора для приема внутрь

Состав.

Для приготовления 1000 мл препарата необходимо:

Действующие вещества:

Чага измельченная – 1000 г

Кобальта хлорида гексагидрат – 1,75 г

Вспомогательные вещества:

Этанол (этиловый спирт) 95 % - 100 г

Вода очищенная – необходимое количество до получения 1000 мл препарата.

Описание

Жидкость темно-коричневого цвета. В процессе хранения допускается выпадение осадка.

Фармакотерапевтическая группа

Общетонизирующие средства.

Код АТХ: A13A

Фармакологическое действие

Действие препарата определяется эффектом входящих в его состав биологически активных веществ (полисахаридов, гуминоподобной чаговой кислоты, органических кислот,

микроэлементов, в т.ч. марганца и кобальта, стероидных и др. соединений). Регулирует метаболические процессы, повышает защитные силы организма; оказывает общеукрепляющее действие.

Показания к применению

Бефунгин показан к применению у взрослых пациентов в комплексной терапии в качестве симптоматического средства при хронических гастритах, дискинезиях желудочно-кишечного тракта с явлениями атонии, при язвенной болезни желудка вне обострения и в качестве симптоматического средства, улучшающего общее состояние онкологических больных.

Противопоказания

Гиперчувствительность к гриба березового экстракту, кобальта хлориду или к любому из вспомогательных веществ, возраст до 18 лет, совместное применение пенициллина, внутривенное введение декстрозы, заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговые травмы, заболевания головного мозга, эпилепсия, период беременности и грудного вскармливания.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Противопоказано применение при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Внутрь, в виде раствора. Для приготовления раствора содержимое флакона взбалтывают, разводят 3 чайные ложки препарата в 150 мл теплой кипяченой воды. Принимают по 1 столовой ложке 3 раза в день за 30 минут до еды. Курс лечения 3-5 месяцев. При необходимости курс повторяют после 7-10- дневного перерыва. Препарат рекомендован к применению у взрослых.

Побочное действие

Классификация частоты возникновения побочных реакций:

очень часто ($\geq 1/10$); часто ($\geq 1/100$, $< 1/10$); нечасто ($\geq 1/1000$, $< 1/100$); редко ($\geq 1/10000$, $< 1/1000$); очень редко ($< 1/10000$), включая отдельные сообщения, частота неизвестна – по имеющимся данным установить частоту возникновения не представлялось возможным.

Нарушения со стороны иммунной системы:

Частота неизвестна: аллергические реакции.

Желудочно-кишечные нарушения:

Частота неизвестна: при длительном применении – диспепсия.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

В период применения препарата противопоказано применение пенициллина, внутривенное введение декстрозы (из-за возможного антагонизма).

Особые указания

Содержание в препарате этанола (этилового спирта) 10%. Содержание абсолютного спирта в максимальной разовой дозе препарата составляет 0,135 г, в максимальной суточной дозе – 0,405 г. Необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

При лечении препаратом показана молочно-растительная диета с исключением консервированных продуктов, острых приправ, животных жиров.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами

Следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и работе с механизмами.

Форма выпуска

Концентрат для приготовления раствора для приема внутрь.

По 40, 50 или 100 мл препарата во флаконы оранжевого стекла, укупоренные полиэтиленовыми пробками и крышками навинчиваемыми.

Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 15 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения

ООО «Тульская фармацевтическая фабрика»

Россия, 300004, г. Тула, Торховский проезд, д. 10

Тел./факс: (4872) 41-04-73.

Производитель/Организация, принимающая претензии:

ООО «Тульская фармацевтическая фабрика»

Россия, 300004, г. Тула, Торховский проезд, д. 10

Тел./факс: (4872) 41-04-73.