МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Кубицин®

лиофилизат для приготовления раствора

для внутривенного введения 350 мг и 500 мг

Лаборатории Мерк Шарп и Доум-Шибре, Франция

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «____» 290121 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
ОПИСАНИЕ Лиофилизат от светло-желтого до светло-коричневого цвета.	**ОПИСАНИЕ** Порошок или пористая масса от светло-желтого до светло-коричневого цвета.
ФОРМА ВЫПУСКА Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения по 350 мг и 500 мг во флакон из бесцветного стекла вместимостью 10 мл, укупоренный резиновой пробкой, обкатанной алюминиевым колпачком с отщелкивающейся крышкой желтого (для дозировки 350 мг) и синего (для дозировки 500 мг) цвета. 1 флакон и инструкцию по применению помещают в картонную пачку, на пачке может присутствовать контроль вскрытия упаковки.	**ФОРМА ВЫПУСКА** Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения по 350 мг и 500 мг во флакон из бесцветного стекла (гидролитический класс 1) вместимостью 10 мл, укупоренный резиновой пробкой, обкатанной алюминиевым колпачком с отщелкивающейся крышкой желтого (для дозировки 350 мг) и синего (для дозировки 500 мг) цвета. 1 флакон и инструкцию по применению помещают в картонную пачку, на пачке может присутствовать контроль вскрытия упаковки.

Ведущий специалист отдела по работе
с регуляторными органами
ООО «МСД Фармасьютикалс» А.Г. Самолюк