ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата АУРИСАН®

Регистрационный номер

МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП 000313-300516
СОГЛАСОВАНО

Торговое название препарата: Аурисан®

Химическое название: [1,10-декаметилен-бис(*N,N*-диметилментоксикарбонил-метил)-аммония дихлорид].

Лекарственная форма: капли ушные.

Состав: 5 мл раствора содержат активного вещества декаметилендиметилментоксикарбонилметиламмония дихлорида (декаметоксина) – 0,0025 г;
вспомогательные вещества: этанол (спирт этиловый) 70 %.

Описание: бесцветная прозрачная жидкость с запахом спирта.

Фармакотерапевтическая группа: Антисептическое средство.
Код АТХ S02AA.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика. Препарат Аурисан® обладает антисептическим действием и имеет широкий спектр антимикробного действия в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов (род Streptococcus, род Staphylococcus, сем. Enterobacteriaceae, Corynebacterium diphtheriae), дрожжеподобных грибов рода Candida, дерматомицетов (род Trichophyton, род Epidermophyton), простейших и вирусов. На микроорганизмы препарат действует бактерицидно, спороцидно, фунгицидно. Аурисан повышает чувствительность бактерий к антибиотикам, потенцирует действие традиционных антимикробных средств при комплексном лечении.

Фармакокинетика:

Не изучена.

Показания к применению

Аурисан® применяют у взрослых и детей для лечения бактериальных и грибковых острых и хронических наружных и средних отитов.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к декаметилендиметилментоксикарбонилметиламмония дихлориду и этанолу, нарушение целостности барабанной перепонки, детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания.

Применение при беременности возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. При необходимости применения в период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Местно. При отитах пациенту в слуховой проход закладывается турунда из ваты или марли, затем на турунду закапывается раствор (согретый до температуры тела) ежедневно по 2-3 капли Аурисана® 3-4 раза в день.

Курс лечения 7 дней. После вскрытия флакон закрывают крышкой-капельницей.

Побочное действие

Возможны местные аллергические реакции: гиперемия, зуд и шелушение кожи наружного слухового прохода, которые исчезают без лечения, после отмены препарата.

Возможно скоропроходящее ощущение жжения при применении препарата, а также реакция местного раздражения уха при повышенной индивидуальной чувствительности к декаметилендиметилментоксикарбонилметиламмония дихлориду (декаметоксину).

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не описаны.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

В настоящее время информация о взаимодействии препарата Аурисан® с другими лекарственными средствами отсутствует.

Особые указания

Аурисан® применяется исключительно при заболеваниях уха. При тяжелых и стойких инфекциях местное лечение необходимо дополнить системным применением антибиотиков.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами.

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и механизмами, а также на выполнение других работ, которые требуют повышенной концентрации внимания и скорости реакции.

Форма выпуска

Капли ушные 0,05 %.

Флаконы по 5 мл с крышкой-капельницей в пачке картонной, вместе с инструкцией по применению.

Условия хранения

Список Б. Хранить в защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.

Срок годности

3 года.

Не применять препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

По рецепту.

Производитель

ООО «Опытный завод «ГНЦЛС», Украина.

Претензии потребителей направлять в адрес производителя.

61057, г. Харьков, ул. Воробьева, 8

Тел/факс: (057)731-29-03

Директор

ООО «Опытный завод «ГНЦЛС» **В.Б. Демехин**

УКРАЇНА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД ГНЦЛС"
код 33338513
МІСТО ХАРКІВ