ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскму применению препарата ОФТАДЕК®

Регистрационный номер

Торговое название препарата: Офтадек®

Лекарственная форма: капли глазные

Состав. Активное вещество: 1 мл раствора содержит декаметоксина – 0,2 мг; вспомогательные вещества: натрия хлорид, вода очищенная.

Описание: бесцветная прозрачная жидкость.

Фармакотерапевтическая группа: антисептическое средство.
Код АТХ [S01A X].

Фармакологические свойства:
Фармакодинамика. Препарат обладает антисептическим и широким спектром антимикробного действия в отношении грамположительных (стафилококки, пневмококки, стрептококки) и грамотрицательных (гонококки, менингококки) кокков, коринебактерий, грамотрицательных бактерий (энтеробактерии, псевдомонады), простейших, дерматофитов, дрожжеподобных грибов рода Candida, хламидий, вирусов. В процессе применения Офтадека резистентность микроорганизмов формируются медленно. Препарат усиливает действие традиционных антимикробных средств при комплексном лечении.
Фармакокинетика: Не изучена.

Показания к применению: острый и хронический конъюнктивит; блефароконъюнктивит; гонобленорея и ее профилактика у новорожденных; хламидиозное поражение слизистой оболочки глаза; профилактика гнойно-воспалительных осложнений до и после хирургических вмешательств в офтальмологии, а также обработка контактных линз.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость декаметоксина.

Применение при беременности и лактации: во время беременности применение препарата оправдано, если потенциальная польза для матери превосходит потенциальный риск для плода. Во время применения препарата грудное вскармливание следует прекратить.

Способ применения и дозы: Местно. Для лечения острого и хронического конъюнктивита и блефароконъюнктивита, гонобленореи, хламидиозного поражения конъюнктивы закапывать в конъюнктивальный мешок по 2 - 3 капли 4 - 6 раз в сутки до полного выздоровления.
Для профилактики бленореи у новорожденных: по 2 капли в оба глаза непосредственно после рождения и через 2 часа после родов.

С профилактической целью: по 2 - 3 капли 4 - 6 раз в сутки до операции и в течение 3 - 5 дней после операции.
Для обработки контактных линз: контактные линзы погружают в раствор препарата на 10 - 15 минут, после чего ополаскивают в стерильном изотоническом растворе натрия хлорида.

Побочные действия: возможны реакции местного раздражения – зуд, гиперемия конъюнктивы. слезотечение.
Передозировка: симптомы передозировки не выявлены.

Лекарственное взаимодействие: не изучено.

Особые указания: при использовании контактных линз их необходимо снять перед закапыванием препарата и можно одеть вновь через 15 минут.
Следует соблюдать осторожность при работе с механизмами и вождении автомобиля.

Форма выпуска: Капли глазные 0,02 %.
Флаконы по 5 мл с крышкой-капельницей в пачке картонной, вместе с инструкцией по применению.

Срок годности: 3 года. После вскрытия флакона раствор хранить 14 суток в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения: Список Б. В защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.

Условия отпуска из аптек: По рецепту.

Производитель
Филиал ООО «Опытный завод «ГНЦЛС», Украина.
Претензии потребителей направлять в адрес производителя.
61057, г. Харьков, ул. Воробьева, 8
Тел.: (8057) 731-36-83.
Тел/факс: (8057) 731-29-03

И.о. директора ИДКЭЛС **А.Н. Васильев**

Директор Филиала ООО «Опытный завод «ГНЦЛС» **В.Б. Демехин**