

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Глюкоза

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Глюкоза

Международное непатентованное или группировочное наименование: Декстроза

Лекарственная форма: таблетки

Состав

1 таблетка содержит

Действующее вещество: декстрозы моногидрат (глюкоза) – 500,0 мг.

Вспомогательные вещества: тальк – 6,0 мг, стеариновая кислота – 4,0 мг.

Описание

Круглые, плоскоцилиндрические таблетки белого цвета, с фаской и риской.

Фармакотерапевтическая группа: лечебное питание; другие продукты лечебного питания; углеводы.

Код АТХ: V06DC01.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Благодаря участию в различных процессах обмена веществ глюкоза оказывает многообразное действие на организм: усиливает окислительно-восстановительные процессы, улучшает антитоксическую функцию печени, поступая в ткани, фосфорилируется, превращаясь в глюкозо-6-фосфат, который активно включается во многие звенья обмена веществ организма, является источником ценного легкоусваиваемого питательного вещества. При метаболизме глюкозы в тканях выделяется значительное количество энергии, необходимой для жизнедеятельности организма.

Фармакокинетика

Данные отсутствуют.

Показания к применению

Препарат Глюкоза показан к применению у взрослых и детей в возрасте от 2 до 18 лет при гипогликемии и недостаточности углеводного питания.

Противопоказания

Гиперчувствительность к декстрозе или к любому из вспомогательных веществ, в составе лекарственного препарата.

Сахарный диабет (кроме случаев гипогликемии).

С осторожностью

Таблетки глюкозы являются источником легкодоступного питательного вещества, однако не являются полноценным заменителем сбалансированного питания.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно по показаниям. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Режим дозирования

Взрослые

По 0,5–2,5–5 г (1–10 таблеток) на прием. При необходимости доза может быть увеличена. Повторный прием возможен с учетом массы тела, не превышая дозы 0,3 г/кг/час.

Дети

Дети от 2 до 18 лет

Режим дозирования для детей в возрасте от 2 до 18 лет не отличается от режима дозирования для взрослых.

Дети от 0 до 2 лет

Лекарственный препарат не показан данной возрастной группе детей в связи с невозможностью обеспечить режим дозирования.

Способ применения

Внутрь. При возникновении трудностей с проглатыванием таблетки ее можно разламывать, разжевывать или рассасывать.

Принимать таблетки следует за 1–1,5 часа до еды из-за возможного снижения аппетита после приема глюкозы.

Побочное действие

Нежелательные реакции перечислены ниже в соответствии с классификацией по основным системам и органам и частоте встречаемости, которая была определена в соответствии с классификацией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): очень часто ($\geq 1/10$); часто ($\geq 1/100$, но $< 1/10$); нечасто ($\geq 1/1\,000$, но $< 1/100$); редко ($\geq 1/10\,000$, но $< 1/1\,000$);

очень редко ($< 1/10\ 000$); частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно).

Общие нарушения и реакции в месте введения

Частота неизвестна: снижение аппетита.

Лабораторные и инструментальные данные

Частота неизвестна: гипергликемия (при сахарном диабете или передозировке).

Передозировка

Данные о передозировке отсутствуют.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Данные отсутствуют.

Особые указания

Данные отсутствуют.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Данные о влиянии препарата на способность к управлению транспортными средствами и выполнение других потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций, отсутствуют.

Форма выпуска

Таблетки, 0,5 г.

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной или светозащитной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

1, 2, 5 или 10 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Допускается контурные ячейковые упаковки помещать в групповую упаковку с равным количеством инструкций по применению.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения

Открытое акционерное общество «Фармстандарт-Томскхимфарм»

(ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм»), Россия

634009, Томская обл., г. Томск, проспект Ленина, д. 211

Тел./факс: +7 (3822) 40-28-56

Производитель

Открытое акционерное общество «Фармстандарт-Лексредства»

(ОАО «Фармстандарт-Лексредства»), Россия

Курская обл., г. Курск, ул. 2-я Агрегатная, д. 1а/18

Тел./факс: +7 (4712) 34-03-13

Организация, принимающая претензии потребителей

Открытое акционерное общество «Фармстандарт-Лексредства»

(ОАО «Фармстандарт-Лексредства»), Россия

305022, Курская обл., г. Курск, ул. 2-я Агрегатная, д. 1а/18

Тел./факс: +7 (4712) 34-03-13