МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Глюкостерил

наименование лекарственного препарата

раствор для инфузий 20 %

лекарственная форма, дозировка

Фрезениус Каби Дойчланд ГмбХ, Германия

наименование производителя, страна

Изменение № 2

Дата внесения Изменения «____» 260521 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Международное непатентованное наименование: декстроза	**Международное непатентованное или группировочное наименование:** декстроза
Состав 1 л раствора содержит Активные вещества глюкозы моногидрат (декстрозы) 220,00 г (что соответствует глюкозе безводной) 200,00 г Вспомогательные вещества воды для инъекций до 1 л кислоты хлористоводородной 25% (для коррекции pH) q.s. натрия гидроксида (для коррекции pH) q.s	**Состав** 1 л раствора содержит: Действующее вещество: декстрозы моногидрат 220,00 г (что соответствует декстрозе безводной) 200,00 г Вспомогательные вещества: вода для инъекций до 1 л 25 % раствор кислоты хлористоводородной (для коррекции pH) q.s. натрия гидроксид (для коррекции pH) q.s.

129318

Старая редакция	Новая редакция
Энергетическая ценность 3360 кДж/л (= 800 ккал/л). Теоретическая осмолярность 1110 мОсм/л.	Энергетическая ценность 3360 кДж/л (= 800 ккал/л). Теоретическая осмолярность 1110 мОсм/л.
Описание Прозрачный бесцветный раствор.	**Описание** Прозрачный от бесцветного до слегка желтоватого цвета раствор.
Форма выпуска По 250 мл, 500 мл или 1000 мл в стеклянные флаконы для инфузионных растворов из стекла гидролитического класса II, укупоренные резиновыми (галобутиловыми) пробками, обкатанные алюминиевыми колпачками, снабженные пластиковыми колпачками-контролем первого вскрытия (Евр.Ф.). По 6 или 10 флаконов вместе с держателями для флаконов или без них, с инструкцией по применению помещают в коробку картонную (для стационаров). По 250 мл, 500 мл или 1000 мл в пластиковый флакон, снабженный петлей-держателем для капельницы, укупоренный комбинированной пластиковой фирменной крышкой «шип-шейп». По 10 или 20 флаконов вместе с инструкцией по применению помещают в коробку картонную (для стационаров).	**Форма выпуска** Раствор для инфузий 20 %. По 250 мл, 500 мл или 1000 мл в стеклянные флаконы для инфузионных растворов из стекла гидролитического класса II, укупоренные резиновыми (галобутиловыми) пробками, обкатанные алюминиевыми колпачками, снабженные пластиковыми колпачками-контролем первого вскрытия (Евр.Ф.). По 6 или 10 флаконов вместе с держателями для флаконов или без них, с инструкцией по применению помещают в коробку картонную (для стационаров). По 250 мл, 500 мл или 1000 мл в полиэтиленовый флакон, снабженный петлей-держателем для капельницы. По 10 или 20 флаконов вместе с инструкцией по применению помещают в коробку картонную (для стационаров).

МЗ РФ ФГБУ НЦЭСМП ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 0000000006

Менеджер по регистрации

Общество с ограниченной ответственностью "Фрезениус Каби" (для документов) ОГРН 1087746830289 Москва

Дмитриева А.В.

129318