ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
Глюгицир

Регистрационный номер _____

Торговое название препарата: Глюгицир

Международное непатентованное или группировочное название:
Декстроза+Натрия цитрат&

Лекарственная форма: раствор гемоконсерванта

Состав на 100 мл.
Натрия гидроцитрата сесквигидрат (натрия цитрата двузамещённого сесквигидрат) - 2,0 г, декстрозы моногидрат (глюкозы моногидрат, глюкоза (С*ФармДекс)) (в пересчете на декстрозу)) - 3,0 г, вода для инъекций до 100 мл.

Описание: бесцветная или слегка желтоватая прозрачная жидкость.

Фармакотерапевтическая группа: гемоконсервант

АТХ [V07AC]

Фармакологическое действие
Раствор Глюгицир обеспечивает антикоагулянтный эффект путем связывания катионов кальция анионами цитрата, содержащаяся в препарате глюкоза служит питанием для клеток крови.
Гемоконсервант смешивается с кровью в соотношении 1 объём к 4 объёмам крови.

Показания к применению
Консервирование донорской крови.

Способ применения и дозы
Кровь заготавливают в полимерные контейнеры "Гемасин", контейнеры полимерные для плазмафереза или контейнеры полимерные для тромбоцитафереза вместимостью 250 мл, 375 мл, 500 мл и 600 мл в соотношении 1 объём гемоконсерванта к 4 объёмам крови.
Заготовку крови, получение из неё компонентов и дальнейшее использование производят в соответствии с «Инструкцией по заготовке и консервированию донорской крови», утверждённой МЗ РФ 29.05.95, и инструкциями по применению изделий.
Срок хранения консервированной крови с Глюгициром - 21 день.
Перед употреблением проверить целостность потребительской тары и герметичность контейнера.

Форма выпуска
Раствор гемоконсерванта.
50 мл, 75 мл, 100 мл, 120 мл в контейнеры:
Однокамерные полимерные контейнеры для крови:
50 мл в емкость контейнера вместимостью 250 мл, 75 мл в емкость контейнера вместимостью 375 мл, 100 мл в емкость контейнера вместимостью 500 мл - "Гемасин";
Двухкамерные полимерные контейнеры для крови и ее компонентов:
50 мл в емкость контейнера вместимостью 250 мл (пустая емкость контейнера 200 мл), 75 мл в емкость контейнера вместимостью 375 мл (пустая емкость контейнера 300 мл); 100 мл в емкость контейнера вместимостью 500 мл (пустая емкость контейнера 400 мл); 120 мл в емкость контейнера вместимостью 600 мл (пустая емкость контейнера 400 мл) - "Гемасин";
100 мл в емкость контейнера вместимостью 500 мл (пустая емкость контейнера 400 мл) - контейнеры полимерные для плазмафереза.
Трехкамерные полимерные контейнеры для крови и ее компонентов:
50 мл в емкость контейнера вместимостью 250 мл (2 пустые емкости контейнера по 200 мл), 75 мл в емкость контейнера вместимостью 375 мл (2 пустые емкости контейнера по 300 мл), 100 мл в емкость контейнера вместимостью 500 мл (2 пустые емкости контейнера по 400 мл), 120 мл в емкость контейнера вместимостью 600 мл (2 пустые емкости контейнера по 400 мл) - "Гемасин".

100 мл в емкость контейнера вместимостью 500 мл (1 пустая емкость контейнера по 400 мл, другая емкость контейнера 400 мл со 100 мл раствора гемоконсерванта «Эрнаф®») - "Гемасин";
120 мл в емкость контейнера вместимостью 600 мл (2 пустые емкости контейнера по 400 мл) - контейнеры полимерные для тромбоцитафереза.
Четырехкамерные полимерные контейнеры для крови и ее компонентов:
100 мл в емкость контейнера вместимостью 500 мл (2 пустые емкости контейнера по 400 мл и одна по 100 мл), 120 мл в емкость контейнера вместимостью 600 мл (2 пустые емкости контейнера по 400 мл и одна по 100 мл) - "Гемасин";
100 мл в емкость контейнера вместимостью 500 мл (2 пустые емкости контейнера по 400 мл, третья емкость контейнера 400 мл со 100 мл раствора гемоконсерванта «Эрнаф®») - "Гемасин";
По 100 мл в две емкости вместимостью 500 мл (2 пустые емкости контейнера по 400 мл) - контейнер полимерный для неаппаратного плазмафереза.
Каждый контейнер с раствором гемоконсерванта комплектуют в изделия.
Изделия упаковывают:
- в три полиэтиленовых пакета: два пакета потребительской тары (внутренний и наружный пакеты) и один групповой пакет.
или
- в полиэтиленовый (внутренний) пакет из полиэтилена и групповой (наружный) пакет из комбинированной многослойной пленки на основе алюминиевой фольги.
Инструкции по медицинскому применению раствора гемоконсерванта вкладывают:
в групповой пакет - при упаковке изделия в три полиэтиленовых пакета;
в транспортную тару - при упаковке изделия в полиэтиленовый (внутренний пакет) и в групповой (наружный) пакет из комбинированной многослойной пленки на основе алюминиевой фольги, в количестве, соответствующем числу групповых пакетов с изделиями.

Срок годности
2 года при упаковке изделий в три полиэтиленовых пакета.
2,5 года при упаковке изделий в полиэтиленовый (внутренний) пакет и в групповой (наружный) пакет из комбинированной многослойной пленки на основе алюминиевой фольги.
Не использовать по окончании срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения
В сухом, защищенном от света и агрессивных сред месте при температуре от 5 до 25 °С.

Допускается замораживание при транспортировании.
Помутнение емкости контейнера полимерного и наличие влаги в пакете с контейнерами при условии герметичности контейнеров не является противопоказанием к применению препарата.
Хранить в местах, недоступных для детей.

Условия отпуска из аптек
Для стационаров

Производитель
Претензии от покупателей принимает предприятие-производитель
Открытое акционерное общество «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез» (ОАО «Синтез»).
640008, Россия, г. Курган, проспект Конституции, 7.
Тел/факс (3522) 48-16-89
e-mail: real@kurgansintez.ru
Интернет-сайт предприятия-производителя: http://www.kurgansintez.ru

Представитель фирмы: В.И.Петухов

РОСЗДРАВНАДЗОРА
ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ
ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7