МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Глюгицир

наименование лекарственного препарата

раствор гемоконсерванта

лекарственная форма, дозировка

Открытое Акционерное общество "Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий "Синтез" (ОАО "Синтез"), Россия

наименование производителя, страна

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «05» апреля 2011 г.

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска. Раствор гемоконсерванта. 50 мл, 75 мл, 100 мл, 120 мл в контейнеры: Однокамерные полимерные контейнеры для крови: 50 мл в емкость контейнера вместимостью 250 мл, 75 мл в емкость контейнера вместимостью 375 мл, 100 мл в емкость контейнера вместимостью 500 мл – «Гемасин»; Двухкамерные полимерные контейнеры для крови и ее компонентов: 50 мл в емкость контейнера вместимостью 250 мл (пустая емкость контейнера	**Форма выпуска.** Раствор гемоконсерванта. 50 мл, 75 мл, 100 мл, 120 мл в контейнеры: Однокамерные полимерные контейнеры для крови: 50 мл в емкость контейнера вместимостью 250 мл, 75 мл в емкость контейнера вместимостью 375 мл, 100 мл в емкость контейнера вместимостью 500 мл – «Гемасин»; Двухкамерные полимерные контейнеры для крови и ее компонентов: 50 мл в емкость контейнера вместимостью 250 мл (пустая емкость контейнера

Старая редакция	Новая редакция
200 мл), 75 мл в емкость контейнера вместимостью 375 мл (пустая емкость контейнера 300 мл); 100 мл в емкость контейнера вместимостью 500 мл (пустая емкость контейнера 400 мл); 120 мл в емкость контейнера вместимостью 600 мл (пустая емкость контейнера 400 мл) – «Гемасин»;	200 мл), 75 мл в емкость контейнера вместимостью 375 мл (пустая емкость контейнера 300 мл); 100 мл в емкость контейнера вместимостью 500 мл (пустая емкость контейнера 400 мл); 120 мл в емкость контейнера вместимостью 600 мл (пустая емкость контейнера 400 мл) – «Гемасин»;
100 мл в емкость контейнера вместимостью 500 мл (пустая емкость контейнера 400 мл) – контейнеры полимерные для плазмафереза.	100 мл в емкость контейнера вместимостью 500 мл (пустая емкость контейнера 400 мл) – контейнеры полимерные для плазмафереза.
Трехкамерные полимерные контейнеры для крови и ее компонентов:	Трехкамерные полимерные контейнеры для крови и ее компонентов:
50 мл в емкость контейнера вместимостью 250 мл (2 пустые емкости контейнера по 200 мл), 75 мл в емкость контейнера вместимостью 375 мл (2 пустые емкости контейнера по 300 мл), 100 мл в емкость контейнера вместимостью 500 мл (2 пустые емкости контейнера по 400 мл), 120 мл в емкость контейнера вместимостью 600 мл (2 пустые емкости контейнера по 400 мл) – «Гемасин».	50 мл в емкость контейнера вместимостью 250 мл (2 пустые емкости контейнера по 200 мл), 75 мл в емкость контейнера вместимостью 375 мл (2 пустые емкости контейнера по 300 мл), 100 мл в емкость контейнера вместимостью 500 мл (2 пустые емкости контейнера по 400 мл), 120 мл в емкость контейнера вместимостью 600 мл (2 пустые емкости контейнера по 400 мл) – «Гемасин».
100 мл в емкость контейнера вместимостью 500 мл (1 пустая емкость контейнера по 400 мл, другая емкость контейнера 400 мл со 100 мл раствора гемоконсерванта «Эрнаф®») – «Гемасин»;	100 мл в емкость контейнера вместимостью 500 мл (1 пустая емкость контейнера по 400 мл, другая емкость контейнера 400 мл со 100 мл раствора гемоконсерванта «Эрнаф®») – «Гемасин»;
120 мл в емкость контейнера вместимостью 600 мл (2 пустые емкости контейнера по 400 мл) – контейнеры полимерные для тромбоцитафереза.	120 мл в емкость контейнера вместимостью 600 мл (2 пустые емкости контейнера по 400 мл) – контейнеры полимерные для тромбоцитафереза.

Старая редакция	Новая редакция
Четырехкамерные полимерные контейнеры для крови и ее компонентов:	Четырехкамерные полимерные контейнеры для крови и ее компонентов:
100 мл в емкость контейнера вместимостью 500 мл (2 пустые емкости контейнера по 400 мл и одна по 100 мл), 120 мл в емкость контейнера вместимостью 600 мл (2 пустые емкости контейнера по 400 мл и одна по 100 мл) – «Гемасин»;	100 мл в емкость контейнера вместимостью 500 мл (2 пустые емкости контейнера по 400 мл и одна по 100 мл), 120 мл в емкость контейнера вместимостью 600 мл (2 пустые емкости контейнера по 400 мл и одна по 100 мл) – «Гемасин»;
100 мл в емкость контейнера вместимостью 500 мл (2 пустые емкости контейнера по 400 мл, третья емкость контейнера 400 мл со 100 мл раствора гемоконсерванта «Эрнаф®») – «Гемасин»;	100 мл в емкость контейнера вместимостью 500 мл (2 пустые емкости контейнера по 400 мл, третья емкость контейнера 400 мл со 100 мл раствора гемоконсерванта «Эрнаф®») – «Гемасин»;
по 100 мл в две емкости вместимостью 500 мл (2 пустые емкости контейнера по 400 мл) – контейнер полимерный для неаппаратного плазмафереза.	по 100 мл в две емкости вместимостью 500 мл (2 пустые емкости контейнера по 400 мл) – контейнер полимерный для неаппаратного плазмафереза.
Каждый контейнер с раствором гемоконсерванта комплектуют в изделия.	Каждый контейнер с раствором гемоконсерванта комплектуют в изделия.
Изделия упаковывают: - в три полиэтиленовых пакета: два пакета потребительской тары (внутренний и наружный пакеты) и один групповой пакет. или - в полиэтиленовый (внутренний) пакет из полиэтилена и групповой (наружный) пакет из комбинированной многослойной пленки на основе алюминиевой фольги.	Изделия упаковывают: - в три полиэтиленовых пакета: два пакета потребительской тары (внутренний и наружный пакеты) и один групповой пакет; или - в полиэтиленовый (внутренний) пакет из полиэтилена и групповой (наружный) пакет из комбинированной многослойной пленки на основе алюминиевой фольги.
Инструкции по медицинскому применению раствора гемоконсерванта вкладывают:	В каждый групповой (наружный) пакет из комбинированной многослойной пленки на основе алюминиевой фольги вкладывают

Изменение № 1 к Инструкции по применению С. 4

Старая редакция	Новая редакция
в групповой пакет – при упаковке изделия в три полиэтиленовых пакета; в транспортную тару – при упаковке изделия в полиэтиленовый (внутренний пакет) и в групповой (наружный) пакет из комбинированной многослойной пленки на основе алюминиевой фольги, в количестве, соответствующем числу групповых пакетов с изделиями.	пакетик из специальной бумаги с латексным покрытием с 10 г силикагеля. Инструкции по медицинскому применению раствора гемоконсерванта вкладывают: в групповой пакет – при упаковке изделия в три полиэтиленовых пакета; в транспортную тару – при упаковке изделия в полиэтиленовый (внутренний) пакет и в групповой (наружный) пакет из комбинированной многослойной пленки на основе алюминиевой фольги, в количестве, соответствующем числу групповых пакетов с изделиями.

Зам. исполнительного директора
ОАО "Синтез"

Канцелярия ОАО "Синтез" подпись

В.И. Петухов
ФИО