МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Глюгицир

наименование лекарственного препарата

раствор гемоконсерванта

лекарственная форма, дозировка

Открытое Акционерное общество "Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий "Синтез" (ОАО "Синтез"), Россия

наименование производителя, страна

Изменение № 2

Дата внесения Изменения «____» 15 07 11 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска. Раст вор гемоконсерванта.	**Форма выпуска.** Раст вор гемоконсерванта.
50 мл, 75 мл, 100 мл, 120 мл в контейнеры:	50 мл, 75 мл, 100 мл, 120 мл в контейнеры:
Однокамерные полимерные контейнеры для крови:	Однокамерные полимерные контейнеры для крови:
50 мл в емкость контейнера вместимостью 250 мл, 75 мл в емкость контейнера вместимостью 375 мл, 100 мл в емкость контейнера вместимостью 500 мл – «Гемасин»;	50 мл в емкость контейнера вместимостью 250 мл, 75 мл в емкость контейнера вместимостью 375 мл, 100 мл в емкость контейнера вместимостью 500 мл – «Гемасин»;
Двухкамерные полимерные контейнеры для крови и ее компонентов:	Двухкамерные полимерные контейнеры для крови и ее компонентов:
50 мл в емкость контейнера вместимостью 250 мл (пустая емкость контейнера	50 мл в емкость контейнера вместимостью 250 мл (пустая емкость контейнера

Старая редакция	Новая редакция
200 мл), 75 мл в емкость контейнера вместимостью 375 мл (пустая емкость контейнера 300 мл); 100 мл в емкость контейнера вместимостью 500 мл (пустая емкость контейнера 400 мл); 120 мл в емкость контейнера вместимостью 600 мл (пустая емкость контейнера 400 мл) – «Гемасин»; 100 мл в емкость контейнера вместимостью 500 мл (пустая емкость контейнера 400 мл) – контейнеры полимерные для плазмафереза. Трехкамерные полимерные контейнеры для крови и ее компонентов: 50 мл в емкость контейнера вместимостью 250 мл (2 пустые емкости контейнера по 200 мл), 75 мл в емкость контейнера вместимостью 375 мл (2 пустые емкости контейнера по 300 мл), 100 мл в емкость контейнера вместимостью 500 мл (2 пустые емкости контейнера по 400 мл), 120 мл в емкость контейнера вместимостью 600 мл (2 пустые емкости контейнера по 400 мл) – «Гемасин». 100 мл в емкость контейнера вместимостью 500 мл (1 пустая емкость контейнера по 400 мл, другая емкость контейнера 400 мл со 100 мл раствора гемоконсерванта «Эрнаф®») – «Гемасин»; 120 мл в емкость контейнера вместимостью 600 мл (2 пустые емкости контейнера по 400 мл) – контейнеры полимерные для тромбоцитафереза.	200 мл), 75 мл в емкость контейнера вместимостью 375 мл (пустая емкость контейнера 300 мл); 100 мл в емкость контейнера вместимостью 500 мл (пустая емкость контейнера 400 мл); 120 мл в емкость контейнера вместимостью 600 мл (пустая емкость контейнера 400 мл) – «Гемасин»; 100 мл в емкость контейнера вместимостью 500 мл (пустая емкость контейнера 400 мл) – контейнеры полимерные для плазмафереза. Трехкамерные полимерные контейнеры для крови и ее компонентов: 50 мл в емкость контейнера вместимостью 250 мл (2 пустые емкости контейнера по 200 мл), 75 мл в емкость контейнера вместимостью 375 мл (2 пустые емкости контейнера по 300 мл), 100 мл в емкость контейнера вместимостью 500 мл (2 пустые емкости контейнера по 400 мл), 120 мл в емкость контейнера вместимостью 600 мл (2 пустые емкости контейнера по 400 мл) – «Гемасин». 100 мл в емкость контейнера вместимостью 500 мл (1 пустая емкость контейнера по 400 мл, другая емкость контейнера 400 мл со 100 мл раствора гемоконсерванта «Эрнаф®») – «Гемасин»; 100 мл в емкость контейнера вместимостью 500 мл (2 пустые емкости контейнера по 400 мл) – контейнеры полимерные для плазмафереза;

Старая редакция	Новая редакция
Четырехкамерные полимерные контейнеры для крови и ее компонентов: 100 мл в емкость контейнера вместимостью 500 мл (2 пустые емкости контейнера по 400 мл и одна по 100 мл), 120 мл в емкость контейнера вместимостью 600 мл (2 пустые емкости контейнера по 400 мл и одна по 100 мл) – «Гемасин»; 100 мл в емкость контейнера вместимостью 500 мл (2 пустые емкости контейнера по 400 мл, третья емкость контейнера 400 мл со 100 мл раствора гемоконсерванта «Эрнаф®») – «Гемасин»; по 100 мл в две емкости вместимостью 500 мл (2 пустые емкости контейнера по 400 мл) – контейнер полимерный для неаппаратного плазмафереза. Каждый контейнер с раствором гемоконсерванта комплектуют в изделия. Изделия упаковывают: - в три полиэтиленовых пакета: два пакета потребительской тары (внутренний и наружный пакеты) и один групповой пакет; или - в полиэтиленовый (внутренний) пакет из полиэтилена и групповой (наружный) пакет из комбинированной многослойной пленки на основе алюминиевой фольги. В каждый групповой (наружный) пакет из комбинированной многослойной пленки на основе алюминиевой фольги вкладывают пакетик из специальной бумаги с латексным	120 мл в емкость контейнера вместимостью 600 мл (2 пустые емкости контейнера по 400 мл) – контейнеры полимерные для тромбоцитафереза. Четырехкамерные полимерные контейнеры для крови и ее компонентов: 100 мл в емкость контейнера вместимостью 500 мл (2 пустые емкости контейнера по 400 мл и одна по 100 мл), 120 мл в емкость контейнера вместимостью 600 мл (2 пустые емкости контейнера по 400 мл и одна по 100 мл) – «Гемасин»; 100 мл в емкость контейнера вместимостью 500 мл (2 пустые емкости контейнера по 400 мл, третья емкость контейнера 400 мл со 100 мл раствора гемоконсерванта «Эрнаф®») – «Гемасин»; по 100 мл в две емкости вместимостью 500 мл (2 пустые емкости контейнера по 400 мл) – контейнер полимерный для неаппаратного плазмафереза. Каждый контейнер с раствором гемоконсерванта комплектуют в изделия. Изделия упаковывают: - в три полиэтиленовых пакета: два пакета потребительской тары (внутренний и наружный пакеты) и один групповой пакет; или - в полиэтиленовый (внутренний) пакет из полиэтилена и групповой (наружный) пакет из комбинированной многослойной пленки на основе алюминиевой фольги.

Старая редакция	Новая редакция
покрытием с 10 г силикагеля. Инструкции по медицинскому применению раствора гемоконсерванта вкладывают: в групповой пакет – при упаковке изделия в три полиэтиленовых пакета; в транспортную тару – при упаковке изделия в полиэтиленовый (внутренний) пакет и в групповой (наружный) пакет из комбинированной многослойной пленки на основе алюминиевой фольги, в количестве, соответствующем числу групповых пакетов с изделиями.	В каждый групповой (наружный) пакет из комбинированной многослойной пленки на основе алюминиевой фольги вкладывают пакетик из специальной бумаги с латексным покрытием с 10 г силикагеля. Инструкции по медицинскому применению раствора гемоконсерванта вкладывают: в групповой пакет – при упаковке изделия в три полиэтиленовых пакета; в транспортную тару – при упаковке изделия в полиэтиленовый (внутренний) пакет и в групповой (наружный) пакет из комбинированной многослойной пленки на основе алюминиевой фольги, в количестве, соответствующем числу групповых пакетов с изделиями.

Зам. исполнительного директора
ОАО "Синтез"



В.И. Петухов
ФИО