# ИНСТРУКЦИЯ

## по медицинскому применению препарата

## ВАЗОБРАЛ

**Регистрационный номер.**

**Торговое название.**

Вазобрал.

**Лекарственная форма.**

Раствор для приема внутрь.

**Состав.**

1 мл раствора содержит:

*Активные компоненты:*

| | |
|---|---|
| Дигидроэргокриптин α-мезилат | 1,0 мг |
| Кофеин | 10,0 мг |

*Вспомогательные вещества:*

Лимонная кислота моногидрат, этанол, глицерин, вода.

**Описание.**

Прозрачный, бесцветный или бледно-желтый раствор с запахом спирта.

**Фармакотерапевтическая группа.**

Вазодилатирующее средство.

**Код АТХ.**

[C04AE51]

**Фармакологические свойства.**

Комбинированный препарат. α-Дигидроэргокриптин – дигидрированное производное спорыньи, блокирует $\alpha_1$ и $\alpha_2$ адренорецепторы. Оказывает дофаминергическое, серотонинергическое действие, уменьшает агрегацию тромбоцитов и эритроцитов, снижает проницаемость сосудистой стенки, увеличивает количество функционирующих капилляров, улучшает

кровообращение и процессы метаболизма в головном мозге, повышает устойчивость тканей мозга к гипоксии.

Кофеин обладает психостимулирующим и аналептическим действием, усиливает процессы возбуждения в коре головного мозга – повышает умственную и физическую работоспособность, уменьшает усталость и сонливость, повышает рефлекторную возбудимость спинного мозга, возбуждает дыхательный и сосудодвигательный центры, оказывает диуретическое действие.

**Фармакокинетика.**

При пероральном приеме, всасывание дигидроэргокриптина ускоряется в присутствии кофеина ( время достижения максимальной концентрации в плазме крови 0,5 часа).

Максимальная концентрация после приема внутрь 8 мг α-дигидроэргокриптина составляет 227 пг/мл, а время полувыведения – менее 2 часов.

**Показания к применению.**

- снижение умственной активности, нарушение внимания и памяти, нарушение ориентации в пространстве, вызванные возрастными изменениями;
- цереброваскулярная недостаточность (в т.ч. вследствие церебрального атеросклероза);
- последствия нарушения мозгового кровообращения;
- профилактика мигрени;
- вестибулярные и лабиринтные нарушения (головокружение, шум в ушах, гипоакузия) ишемического генеза;
- болезнь Меньера;
- ретинопатия (диабетическая и гипертоническая);
- нарушения периферического артериального кровообращения (синдром и болезнь Рейно);
- венозная недостаточность.

**Противопоказания.**

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

**Беременность и период лактации.**

Нет клинических данных о применении Вазобрала в период беременности и кормления грудью. Применение препарата в период грудного вскармливания может приводить к уменьшению лактации.

**Способ применения и дозы.**

Внутрь (во время еды, с небольшим количеством жидкости) по 2-4 мл (1-2 дозирующего шприца) 2 раза в день. Продолжительность курса лечения 2-3 месяца, при необходимости курсы лечения можно проводить 1-2 раза в год.

**Побочное действие.**

Со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, гастралгия, диспепсия, при этих проявлениях отмена препарата не требуется. Редко (не более 1 % случаев) – головокружение, возбуждение, головная боль. Очень редко (не более 0,1 % случаев) возможны аллергические реакции, тахикардия, гипотензия.

**Передозировка.**

Симптомы – усиление выраженности побочных эффектов. Лечение симптоматическое.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами.**

При одновременном назначении Вазобрала и гипотензивных препаратов возможно развитие артериальной гипотонии. Кофеин ослабляет действие снотворных средств.

**Особые указания.**

Вазобрал оказывает сосудорасширяющее действие, не влияя на системное артериальное давление. Назначение Вазобрала больным с артериальной гипертензией не исключает необходимость применение антигипертензивных средств. Содержащийся в препарате кофеин может вызвать нарушение сна, тахикардию.

**Форма выпуска.**

По 50 мл во флакон темного стекла вместе с инструкцией по применению и дозирующим шприцем в картонную коробку.

**Условия хранения.**

При температуре 15 – 25 °С, в недоступном для детей месте.

**Срок годности.**

3 года. Не использовать после истечения срока годности.

**Условия отпуска из аптек.**

По рецепту.

**Производитель.**

CHIESI S.A.,
11, avenue Dubonnet
92400 COURBEVOIE, FRANCE

Кьези С.А.,
11, авеню Дюбонне
92400 Курбевуа, Франция

Представительство в России:
ФармаРежи Дистрибюсьон С.А.
101509, г. Москва ул.Лесная, д.43, офис 701
тел. +7 095 7832680

Директор ИДКЭЛ,
Профессор Чельцов В.В.

Представитель фирмы Некрасов О.В.