МИНЗДРАВ РОССИИ
ПN014822/01- 150813
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

ДИГОКСИН ГРИНДЕКС
наименование лекарственного препарата

таблетки 0,25 мг
лекарственная форма, дозировка

АО «Гриндекс», Латвия
наименование производителя, страна

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «____» 150813 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Торговое название препарата: Дигоксин Гриндекс	**Торговое название препарата:** ДИГОКСИН ГРИНДЕКС
Состав 1 таблетка содержит: *активное вещество* - дигоксин 0,25 мг; *вспомогательные вещества:* сахароза, крахмал картофельный, глюкозы (декстрозы) моногидрат, тальк, кальция стеарат, парафин жидкий (вазелиновое масло).	**Состав** 1 таблетка содержит: *активное вещество* - дигоксин 0,25 мг; *вспомогательные вещества:* сахароза – 24,60 мг, крахмал картофельный – 15,30 мг, глюкозы (декстрозы) моногидрат – 8,50 мг, тальк – 0,90 мг, кальция стеарат – 0,25 мг, парафин жидкий (вазелиновое масло) – 0,20 мг.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ ***Способ применения*** – внутрь. Как и для всех сердечных гликозидов, дозу следует подбирать с осторожностью, индивидуально для каждого пациента. Если больной перед назначением дигоксина принимал сердечные гликозиды, в этом случае дозу препарата необходимо уменьшить.	**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ** ***Способ применения*** – внутрь. Как и для всех сердечных гликозидов, дозу следует подбирать с осторожностью, индивидуально для каждого пациента. Если больной перед назначением дигоксина принимал сердечные гликозиды, в этом случае дозу препарата необходимо уменьшить.

Взрослые и дети старше 10 лет Доза препарата Дигоксин Гриндекс зависит от необходимости быстрого достижения терапевтического эффекта. *Умеренно быстрая дигитализация (24-36 ч) применяется в экстренных случаях* Суточная доза 0,75–1,25 мг, разделенная на 2 приема, под контролем ЭКГ перед каждой последующей дозой. После достижения насыщения переходят на поддерживающее лечение. *Медленная дигитализация* (5–7 дней) Суточная доза 0,125–0,5 мг назначается 1 раз в сутки в течение 5–7 дней (до достижения насыщения), после чего переходят на поддерживающее лечение. *Хроническая сердечная недостаточность (ХСН)* У пациентов с ХСН препарат Дигоксин Гриндекс должен применяться в малых дозах: до 0,25 мг в сутки (для пациентов с массой тела более 85 кг до 0,375 мг в сутки). У пожилых пациентов суточная доза дигоксина должна быть снижена до 0,0625–0,0125 мг (1/4; 1/2 таблетки). *Поддерживающая терапия* Суточная доза для поддерживающей терапии устанавливается индивидуально и составляет 0,125–0,75 мг. Поддерживающую терапию, как правило, проводят длительно. **Дети в возрасте от 3-х до 10 лет** Насыщающая доза для детей составляет 0,05-0,08 мг/кг/сут; эту дозу назначают в течение 3–5 дней при умеренно быстрой дигитализации или в течение 6–7 дней при медленной дигитализации. Поддерживающая доза для детей составляет 0,01–0,025 мг/кг/сут. **Нарушение функции почек** При нарушении выделительной функции почек необходимо уменьшить дозу	**Взрослые и дети старше 10 лет** Доза препарата Дигоксин Гриндекс зависит от необходимости быстрого достижения терапевтического эффекта. *Умеренно быстрая дигитализация (24-36 ч) применяется в экстренных случаях* Суточная доза 0,75–1,25 мг, разделенная на 2 приема, под контролем ЭКГ перед каждой последующей дозой. После достижения насыщения переходят на поддерживающее лечение. *Медленная дигитализация* (5–7 дней) Суточная доза 0,125–0,5 мг назначается 1 раз в сутки в течение 5–7 дней (до достижения насыщения), после чего переходят на поддерживающее лечение. *Хроническая сердечная недостаточность (ХСН)* У пациентов с ХСН препарат Дигоксин Гриндекс должен применяться в малых дозах: до 0,25 мг в сутки (для пациентов с массой тела более 85 кг до 0,375 мг в сутки). У пожилых пациентов суточная доза дигоксина должна быть снижена до 0,0625–0,125 мг (1/4; 1/2 таблетки). *Поддерживающая терапия* Суточная доза для поддерживающей терапии устанавливается индивидуально и составляет 0,125–0,75 мг. Поддерживающую терапию, как правило, проводят длительно. **Дети в возрасте от 3-х до 10 лет** Насыщающая доза для детей составляет 0,05-0,08 мг/кг/сут; эту дозу назначают в течение 3–5 дней при умеренно быстрой дигитализации или в течение 6–7 дней при медленной дигитализации. Поддерживающая доза для детей составляет 0,01–0,025 мг/кг/сут. **Нарушение функции почек** При нарушении выделительной функции почек необходимо уменьшить дозу