МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНЗДРАВ РОССИИ
ПN015389/01-130514
СОГЛАСОВАНО

# ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Сиэль
наименование лекарственного препарата
таблетки 50 мг
лекарственная форма, дозировка
Тева Оперейшнс Поланд Сп. з о.о., Польша
наименование производителя, страна

Изменение № 3

Дата внесения Изменения «____» 130514 20___ г.

| Старая редакция | Новая редакция |
|---|---|
| **Торговое название:** Сиэль | **Торговое название препарата:** Сиэль-Тева |
| **Состав:**<br>1 таблетка содержит:<br>*активное вещество:* дименгидринат* 50 мг,<br>*вспомогательные вещества:* целлюлоза микрокристаллическая, кремния диоксид коллоидный, тальк, стеарат магния.<br>* - дименгидринат представляет собой смесь двух веществ дифенгидрамина и 8-хлоротеофиллина. | **Состав**<br>1 таблетка содержит:<br>*активное вещество:* дименгидринат* 50,0 мг,<br>*вспомогательные вещества:* целлюлоза микрокристаллическая 46,025 мг, кремния диоксид коллоидный 0,300 мг, тальк 3,375 мг, стеарат магния 0,300 мг.<br>* - дименгидринат представляет собой смесь двух веществ дифенгидрамина и 8-хлоротеофиллина. |
| **Взаимодействия с другими препаратами**<br>• Усиливает действие атропина, трициклических антидепрессантов, катехоламинов, барбитуратов, алкоголя, | **Взаимодействие с другими лекарственными препаратами**<br>• Усиливает действие атропина, трициклических антидепрессантов, катехоламинов, барбитуратов, алкоголя, |

| | |
|---|---|
| седативных и снотворных средств, нейролептиков;<br>• ингибиторы моноаминооксидазы усиливают антихолинергический эффект дименгидрината;<br>• действие дименгидрината ослабляется при применении с амфетамином и его производными и усиливается при совместном приеме с диазепамом;<br>• необходимо соблюдать осторожность пациентам при одновременном приеме дименгидрината с лекарственными средствами, вызывающими гипокалиемию (например, диуретические средства);<br>• ослабляет подавляющее действие ацетилхолина на миокард;<br>• ослабляет действие глюкокортикостероидов и непрямых антикоагулянтов;<br>• нельзя принимать препарат одновременно с ототоксическими антибиотиками (в т.ч. стрептомицином, неомицином, виомицином, канамицином, амикацином) ввиду усиления ототоксического действия;<br>• необходимо соблюдать осторожность пациентам при одновременном приеме дименгидрината с лекарственными средствами, вызывающими удлинение интервала Q-T (антиаритмические препараты класса IA и III; эритромицин; противомалярийные | седативных и снотворных средств, нейролептиков;<br>• ингибиторы моноаминоксидазы усиливают антихолинергический эффект дименгидрината;<br>• действие дименгидрината ослабляется при применении с амфетамином и его производными и усиливается при совместном приеме с диазепамом;<br>• необходимо соблюдать осторожность пациентам при одновременном приеме дименгидрината с лекарственными средствами, вызывающими гипокалиемию (например, диуретические средства);<br>• ослабляет подавляющее действие ацетилхолина на миокард;<br>• ослабляет действие глюкокортикостероидов и непрямых антикоагулянтов;<br>• нельзя принимать препарат одновременно с ототоксическими антибиотиками (в т.ч. стрептомицином, неомицином, виомицином, канамицином, амикацином) ввиду усиления ототоксического действия;<br>• необходимо соблюдать осторожность пациентам при одновременном приеме дименгидрината с лекарственными средствами, вызывающими удлинение интервала Q-T (антиаритмические препараты класса IA и III; эритромицин; противомалярийные |

| | |
|---|---|
| препараты; цизаприд; антигистаминные средства; нейролептики) и вызывающими гипокалиемию (некоторые диуретики);<br>• одновременный прием с солями висмута, нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП), психотропными средствами и скополамином может приводить к нарушению зрения.<br>**Адрес для приема претензий:**<br>119049, Москва, ул. Шаболовка, 10, стр.1.<br>Тел.: (495) 644-22-34, факс: (495) 644-22-35/36. | препараты; цизаприд; антигистаминные средства; нейролептики) и вызывающими гипокалиемию (некоторые диуретики);<br>• одновременный прием с солями висмута, нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП), психотропными средствами и скополамином может приводить к нарушению зрения.<br>**Претензии потребителей направлять по адресу:**<br>119049, Москва, ул. Шаболовка, 10, стр.1.<br>Тел.: (495) 644-22-34, факс: (495) 644-22-35/36. |

Руководитель группы по регистрации А.А.Гаврюшина

«Тева» «Teva» LLC