МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛС-000886- 230617
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Зорекс®

капсулы 150 мг + 7 мг и 250 мг + 10 мг

ПАО «Валента Фарм», Россия

Изменение № 6

Дата внесения Изменения «____» 230617 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Противопоказания Повышенная чувствительность к компонентам препарата, тяжелые декомпенсированные заболевания печени и почек; детский возраст до 18 лет.	**Противопоказания** Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Тяжелые декомпенсированные заболевания печени и почек. Возникновение аллергических реакций при предыдущем приеме препарата. Детский возраст до 18 лет.
Побочное действие Редко: аллергические реакции (кожный зуд, крапивница, сыпь на коже и слизистых, отек слизистых, генитальный зуд, стоматит). Очень редко: появление аллергической реакции по типу ангионевротического отека или синдрома Стивена-Джонсона (внезапное повышение температуры тела, недомогание, пятнисто-везикулезные или буллезные высыпания на коже, слизистых оболочках полости	**Побочное действие** Редко: аллергические реакции (кожный зуд, крапивница, сыпь на коже и слизистых, отек слизистых, генитальный зуд, стоматит). Очень редко: появление аллергической реакции по типу ангионевротического отека или синдрома Стивена-Джонсона (внезапное повышение температуры тела, недомогание, пятнисто-везикулезные или буллезные высыпания на коже, слизистых оболочках полости

Старая редакция	Новая редакция
рта, половых органов, в области заднего прохода). В этом случае следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу. Риск развития аллергических реакций выше у лиц с бронхиальной астмой или наличием аллергии в анамнезе. При применении в высоких дозах: тошнота, головокружение, тахикардия, бледность кожных покровов. **Особые указания** *Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами:* препарат не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.).	рта, половых органов, в области заднего прохода), синдром Лайелла, конъюнктивит. В этом случае следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу. Риск развития аллергических реакций выше у лиц с бронхиальной астмой или наличием аллергии в анамнезе. При применении в высоких дозах: тошнота, головокружение, тахикардия, бледность кожных покровов. **Особые указания** При пострегистрационном применении препарата «очень редко» зарегистрированы тяжелые аллергические реакции: синдром Стивена-Джонсона и синдром Лайелла (см. раздел «Побочное действие»). Прием препарата в случае возникновения аллергических реакций при его предыдущем приеме, противопоказан (см. раздел «Противопоказания») в связи с риском усиления тяжести аллергической реакции из-за сенсибилизации (повышения чувствительности организма к воздействию раздражителя, вызывающего аллергическую реакцию за счет выработки антител). *Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами:* препарат не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автомобилем и другими транс-

Старая редакция	Новая редакция
	портными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.).

Исполнительный директор
ПАО «Валента Фарм» А.А. Биккенин