

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Метилурацил

Регистрационный номер

Торговое наименование лекарственного средства

Метилурацил

Международное непатентованное или группировочное наименование

Диоксометилтетрагидропиримидин

Лекарственная форма

Таблетки

Состав

1 таблетка содержит:

Действующее вещество: метилурацил – 0,5 г.

Вспомогательные вещества: лактоза, крахмал картофельный, повидон (Коллидон 25), кремния диоксид коллоидный, кальция стеарат.

Описание

Таблетки белого цвета плоскоцилиндрической формы с риской и фаской.

Фармакотерапевтическая группа

Иммуностимуляторы; другие иммуностимуляторы.

Код АТХ: L03AX

Фармакологические свойства

Обладает анаболической активностью. Оказывает гемopoэтическое, лейкопоэтическое, иммуностимулирующее, противовоспалительное действие. Нормализуя нуклеиновый обмен, ускоряет процессы клеточной регенерации в ранах, ускоряя рост и грануляционное созревание ткани и эпителизацию (в т. ч. в быстро пролиферирующих клетках слизистой ЖКТ), стимулирует эритро- и лейкопоэз, клеточные и гуморальные факторы иммунитета.

Показания к применению

Лейкопения (легкие формы, в т. ч. возникшая в результате химиотерапии злокачественных новообразований, при рентгено- и лучевой терапии), агранулоцитарная ангина, алиментарно-токсическая алейкия, анемия, тромбоцитопения, интоксикация бензолом, лучевая болезнь, реконвалесценция (после тяжелых инфекций), язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, вялозаживающие раны, ожоги, переломы костей, панкреатит. В составе комплексной терапии по всем показаниям.

Противопоказания

- Гиперчувствительность к диоксометилтетрагидропиримидину или к любому из вспомогательных веществ;
- Детский возраст до 3 лет;
- Беременность и грудное вскармливание (см. раздел «Применение при беременности и в период грудного вскармливания»);
- Лейкоз (лейкемические формы, особенно миелоидные);
- Лимфогранулематоз;
- Гемобластозы;
- Злокачественные заболевания костного мозга.

С осторожностью

Данные отсутствуют.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Прием препарата во время беременности и в период грудного вскармливания противопоказан.

Способ применения и дозы

Внутрь во время или после еды. Взрослым по 1 таблетке (500 мг) 4-6 раз в сутки (при необходимости – до 6 раз в сутки, максимальная суточная доза – 3000 мг). Детям от 3 до 8 лет по 1/2 таблетки (0,25 г) 3 раза в сутки. Детям от 8 до 18 лет по 1/2-1 таблетке (0,25-0,5 г) 3 раза в сутки. Продолжительность лечения при заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта – 30-40 дней; в других случаях курс лечения может быть менее продолжительным.

Побочное действие

Аллергические реакции, головная боль, головокружение, изжога.

Передозировка

Данные отсутствуют.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Усиливает противолучевое действие цистамин.

Особые указания

Метилурацил целесообразно назначать при легких формах лейкопении. При заболевании средней степени тяжести препарат принимают только после восстановления нарушений регенерации клеток крови. При тяжелых формах поражения кроветворения метилурацил не назначают.

Вспомогательные вещества

Лекарственный препарат содержит лактозу. Данный лекарственный препарат не следует принимать пациентам с редко встречающейся наследственной непереносимостью галактозы, лактазной недостаточностью или глюкозо-галактозной мальабсорбцией.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Метилурацил не оказывает влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами. Пока не будет выяснена индивидуальная реакция пациента на препарат, следует воздержаться от управления автотранспортом или работы с механизмами, учитывая, что во время лечения метилурацилом возможны следующие побочные реакции со стороны нервной системы: головокружение.

Форма выпуска

Таблетки, 500 мг.

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной; и фольги алюминиевой печатной лакированной.

5 контурных упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В сухом защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают по рецепту.

Производитель

АО «Валента Фарм»

141101, Россия, Московская область, г. Щелково, ул. Фабричная, д. 2.

Тел. +7 (495) 933 48 62.

Факс +7 (495) 933 48 63.

**Наименование и адрес юридического лица, на имя которого выдано
регистрационное удостоверение/Организация, принимающая претензии
потребителей**

АО «Новосибхимфарм»

630028, Россия, г. Новосибирск, ул. Декабристов, д. 275.

Тел. +7 (383) 363 32 44.

Факс +7 (383) 363 32 55.