ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
Метилурацил-АКОС

Регистрационный номер:

Торговое название препарата: Метилурацил-АКОС

МНН или группировочное название: диоксометилтетрагидропиримидин

Лекарственная форма: мазь для наружного применения

Состав на 100 г мази:

Активное вещество: диоксометилтетрагидропиримидин (метилурацил) – 10,0 г;

Вспомогательные вещества: вазелин (вазелин медицинский), ланолин водный полученный: ланолин (ланолин безводный), вода (вода очищенная).

Описание: Мазь желтоватого цвета.

Фармакотерапевтическая группа: стимулятор репарации тканей

Код АТХ [D11AX]

Фармакологическое действие

Фармакодинамика

Обладает анаболической активностью. Оказывает гемопоэтическое, лейкопоэтическое, иммуностимулирующее, противовоспалительное действие. Нормализуя нуклеиновый обмен, ускоряет процессы клеточной регенерации в ранах, ускоряя рост и грануляционное созревание ткани, стимулирует эритро- и лейкопоэз, клеточные и гуморальные факторы иммунитета.

При наружном применении обладает фотопротекторными свойствами.

Показания к применению

Вялозаживающие раны, ожоги (термические, химические, лучевые), переломы костей, буллёзные дерматиты, трофические язвы, пролежни, глубокие раны.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату.

Детский возраст.

Избыточность грануляций в ране.

Применение при беременности и лактации

Применение препарата в периоды беременности и лактации возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

При необходимости назначения препарата в период лактации следует прекратить грудное вскармливание.

Способ применения и дозы

Наружно.

Для лечения острых буллёзных лучевых дерматитов, ожогов, ран и язв применяют местно 10 % мазь Метилурацил-АКОС, которая совместима с наружными аппликациями сульфаниламидов, антибиотиков и антисептических средств. Мазь наносят на поврежденные участки тонким слоем в количестве 5-20 г ежедневно в течение 15-30 дней.

Данных о применении препарата у детей нет.

Побочное действие

Аллергические реакции.

Форма выпуска

Мазь для наружного применения 10 %.

По 25 г в тубах алюминиевых.

Каждая туба с инструкцией по применению в пачке из картона.

Срок годности

3 года 6 месяцев. Не применять по истечении срока годности.

Условия хранения

Список Б. В сухом, защищенном от света месте при температуре от 8 до 15 ^{o}C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Претензии от покупателей принимает предприятие-производитель:

Открытое акционерное общество «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез» (ОАО «Синтез»)

Российская Федерация, 640008, г. Курган, проспект Конституции, 7,

тел (3522) 48-16-89, http://www.kurgansintez.ru

Зам. исполнительного директора
ОАО "Синтез"

В.И.Петухов

