

## ИНСТРУКЦИЯ

### ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА СТИЗАМЕТ®

**Регистрационное удостоверение:**

**Торговое наименование:** Стизамет®

**Международное непатентованное или группировочное наименование:**  
Диоксометилтетрагидропиримидин

**Лекарственная форма:** мазь для местного и наружного применения

#### **Состав**

*Действующее вещество:* диоксометилтетрагидропиримидин (метилурацил) - 3,0 г.

*Вспомогательные вещества:* парафин жидкий (масло вазелиновое) – 8,0 г, воск эмульсионный – 8,0 г, глицерол (глицерин) – 10,0 г, этанол (спирт этиловый) 95 % - 10,0 г, вода очищенная до 100,0 г.

**Описание:** однородная мазь белого или почти белого цвета.

**Фармакотерапевтическая группа:** другие препараты, применяемые в дерматологии.

**Код АТХ:** D11AX.

#### **Фармакологические свойства**

Стизамет® оказывает противовоспалительное действие, стимулирует регенерацию кожи и уменьшает вероятность нагноения. Препарат усиливает синтез внутриклеточных белков и нуклеиновых кислот, активирует фибробластическую реакцию в дерме. Стизамет® обладает также фотозащитным действием.

#### **Фармакокинетика**

Благодаря эмульсионной основе Стизамет® легко проникает в кожу. При нанесении на кожу максимальная концентрация метилурацила в крови достигается через 2 часа, время полувыведения составляет 5,1 часа.

#### **Показания к применению**

Воспалительные заболевания кожи (экзема, нейродермит, дерматиты), плохо заживающие раны, ожоги (термические, химические, лучевые в репаративной стадии), эрозии и язвы кожи (в том числе после лучевой терапии), трофические язвы, пролежни, трещины кожи заднего прохода и молочных желез. Может использоваться с профилактической целью для предупреждения реакций кожи при облучении новообразований с невысокой радиочувствительностью, уменьшения радиоэпителиита и поздних сращений стенок (окклюзий)

влагалища – в случае лучевой терапии новообразований гениталий.  
Применяется также как фотозащитное средство при фотодерматозах.

### **Противопоказания**

Гиперчувствительность к диоксомегилтетрагидропиримидину (метилурацилу) или к любому из вспомогательных веществ, острые и хронические формы лейкозов и другие злокачественные заболевания системы органов кроветворения, избыточность грануляций в ране.

### **Применение при беременности и лактации**

#### *Беременность*

Применение возможно только в том случае, когда ожидаемая польза применения для матери превышает потенциальный риск для плода.

#### *Период грудного вскармливания*

При необходимости назначения препарата в период лактации грудное вскармливание следует прекратить.

### **Способ применения и дозы**

Наружно, местно. Мазь наносят тонким слоем на пораженные участки кожи 2 раза в день, при эрозиях, язвах и ранах – после предварительной обработки антисептиками. При радиоэпителиите и поздних лучевых повреждениях влагалища мазь используется на рыхлых тампонах в виде аппликаций. Разовая доза из расчета площади обрабатываемой поверхности кожи составляет от 1 до 10 г мази. Курс лечения – до полного заживления. При хронических заболеваниях длительность курса – до 2 мес. Курсовая доза может составлять 60-80 г и более (до 300 г).

### **Побочные эффекты**

Редко аллергические реакции, кратковременное жжение.

### **Передозировка**

Не выявлена.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Можно назначать одновременно с другими дерматотропными средствами, в том числе с глюкокортикостероидами, антибактериальными и антисептическими средствами для наружного применения.

### **Особые указания**

С осторожностью использовать при кожных заболеваниях, сопровождающихся образованием избыточных разрастаний ткани: вегетирующей пузырьчатке, вегетирующей пиодермии, веррукозной форме красного плоского лишая,

веррукозной эпидермодисплазии и др., избыточных грануляциях в ране и язвах, при острых воспалительных заболеваниях кожи и в период обострения хронических. Препарат следует также применять с осторожностью на больших по площади участках кожи при нарушениях обмена холестерина и тяжелых заболеваниях печени. При радиоэпителиите и поздних лучевых повреждениях влагалища мазь используется на рыхлых тампонах в виде аппликаций.

### **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

### **Форма выпуска**

По 10, 15, 20, 35 г в тубу алюминиевую.

Каждую тубу вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

### **Условия хранения**

При температуре от 2 до 8 °С.

Замораживание не допускается.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

2 года. Не использовать по истечении срока годности.

### **Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

### **Владелец регистрационного удостоверения /Производитель/**

#### **Организация, принимающая претензии:**

АО «Ретиноиды», Россия

*Юридический адрес:*

143983, Московская обл., г. Балашиха, ул. Свободы (Керамик мкр.), д.1А, офис 404

*Адрес места производства и принятия претензий:*

143983, Московская обл., г.о. Балашиха, г. Балашиха, мкр. Керамик, ул. Свободы, д.1А

Тел./факс: (495) 234-61-17

www.retinoids.ru