ЛП-№(013409)-(РГ-RU) от 02.02.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 28.01.2026 № 1413
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
ОКСОЛИНОВАЯ МАЗЬ

Регистрационный номер:

Торговое наименование: ОКСОЛИНОВАЯ МАЗЬ

Международное непатентованное или группировочное наименование: диоксотетрагидрокситетрагидронафталин

Лекарственная форма: мазь назальная

СОСТАВ

100 г препарата содержат:

Действующее вещество:

диоксотетрагидрокситетрагидронафталин (оксолин) – 0,25 г.

Вспомогательные вещества:

парафин жидкий (вазелиновое масло) – 0,5 г;

вазелин – 99,25 г.

Описание

Однородная мазь от белого до светло-желтого цвета. При хранении допускается появление розового оттенка.

Фармакотерапевтическая группа: препараты для лечения заболеваний носа; деконгестанты и другие препараты для местного применения; другие препараты для лечения заболеваний носа.

Код АТХ: R01AX10

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Обладает противовирусной активностью, блокируя места связывания вируса гриппа (преимущественно типа А2) с поверхностью клеточной мембраны, защищает клетки от проникновения в них вируса.

Фармакокинетика

При нанесении на слизистую оболочку носа всасывается до 20 % препарата. В

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 28.01.2026 № 1413
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

организме не кумулирует и выводится в основном почками в течение суток.

Показания к применению

Препарат Оксолиновая мазь показан к применению у взрослых пациентов и детей до 18 лет для профилактики гриппа и лечения вирусных ринитов.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к диоксотетрагидрокситетрагидронафталину и другим компонентам препарата.

С осторожностью

Беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 2-х лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

Способ применения и дозы

Местно.

Профилактика гриппа: полоской мази длиной от 3 до 5 мм смазывают ежедневно 2-3 раза в день слизистую оболочку носа в период подъема и максимального развития эпидемической вспышки гриппа (на протяжении 25 дней) или при контакте с больным гриппом.

Лечение вирусного ринита: полоской мази длиной от 3 до 5 мм смазывают слизистую оболочку носа 2-3 раза в день в течение 3-4 дней.

Если после лечения улучшения не наступает, симптомы усугубляются или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Быстропроходящее чувство жжения слизистой оболочки носа, ринорея. В редких случаях возможно окрашивание слизистой оболочки носа в синий цвет.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 28.01.2026 № 1413
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Передозировка

Случаи передозировки не описаны.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не изучалось.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстроты психомоторных реакций (работа диспетчера, управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска

Мазь назальная, 0,25 %.

По 10 г, 15 г, 20 г, 25 г, 30 г в банки темного стекла типа БТС, укупоренные крышками полиэтиленовыми из полиэтилена высокого давления, натягиваемыми с уплотнительным элементом. На банки наклеивают этикетки из бумаги этикеточной или писчей, или самоклеящиеся.

По 10 г, 15 г, 20 г, 25 г, 30 г в тубы алюминиевые, покрытые лаком, укупоренные бушоном из полиэтилена низкого давления. Каждую банку или алюминиевую тубу вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона. Пачки помещают в групповую упаковку.

Условия хранения

При температуре не выше 15 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения / Организация, принимающая претензии потребителей

Российская Федерация.

Акционерное общество «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод» (АО

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 28.01.2026 № 1413
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

«Усолье-Сибирский химфармзавод»).

665452, Иркутская обл., г.о. город Усолье-Сибирское, тер. Промышленный массив, ул. Индустриальная, зд. 62.

Тел.: +7 (395) 435-89-08.

Электронная почта: usolpharm@usolpharm.ru

Производитель

Российская Федерация.

АО «Усолье-Сибирский химфармзавод»,

665452, Иркутская обл., г.о. город Усолье-Сибирское, тер. Промышленный массив, ул. Индустриальная, зд. 62.