ЛП-№(004800)-(РГ-RU) от 06.03.2024

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 04.03.2024 № 4216
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Оксолин-АКОС

Регистрационный номер

Торговое наименование

Оксолин-АКОС

Международное непатентованное или группировочное наименование

Диоксотетрагидрокситетрагидронафталин

Лекарственная форма

Мазь назальная

Состав на 100 г

Действующее вещество

Диоксотетрагидрокситетрагидронафталин – 0,25 г.

Вспомогательные вещества

Масло вазелиновое медицинское, лимонной кислоты моногидрат, парафин белый мягкий (вазелин).

Описание

Однородная мазь от белого до светло-желтого цвета. При хранении допускается появление розового оттенка.

Фармакотерапевтическая группа

Препараты для лечения заболеваний носа; деконгестанты и другие препараты для местного применения; другие препараты для лечения заболеваний носа.

Код АТХ

R01AX10.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Препарат обладает противовирусной активностью, блокируя места связывания вируса гриппа (преимущественно А2) с поверхностью клеточной мембраны, защищает клетки от проникновения в них вируса.

Фармакокинетика

При нанесении на слизистую оболочку носа всасывается до 20 % препарата. В организме не кумулирует и выводится в основном почками в течение суток.

Показания к применению

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 04.03.2024 № 4216
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Профилактика гриппа, лечение вирусных ринитов.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к диоксотетрагидрокситетрагидронафталину и другим вспомогательным веществам, входящим в состав препарата.

С осторожностью

Беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 2-х лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

Способ применения и дозы

Интраназально.

Профилактика гриппа: полоской мази длиной от 3 до 5 мм смазывают ежедневно 2-3 раза в день слизистую оболочку носа в период подъема и максимального развития эпидемической вспышки гриппа (на протяжении 25 дней) или при контакте с больным гриппом.

Лечение вирусного ринита: полоской мази длиной от 3 до 5 мм смазывают слизистую оболочку носа 2-3 раза в день в течение 3-4 дней.

Если после лечения улучшение не наступает, или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Нежелательные реакции сгруппированы по частоте развития в соответствии со следующей классификацией: очень часто (> 1/10); часто (от > 1/100 до < 1/10); нечасто (от > 1/1000 до < 1/100); редко (от > 1/10000 до < 1/1000); очень редко (< 1/10000); частота неизвестна (не может быть оценена на основе имеющихся данных).

Системно-органный класс	**Частота**	**Нежелательные реакции**
Общие нарушения и реакции в месте введения	Редко	Синее окрашивание слизистой оболочки.
	Неизвестно	Жжение слизистой оболочки полости носа, ринорея.

Передозировка

Случаи передозировки препарата не описаны.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 04.03.2024 № 4216
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействия

Не изучалось.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами

Применение препарата не оказывает влияние на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (работа диспетчера, управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска

Мазь назальная, 0,25 %.

По 5 г, 10 г, 30 г в тубы алюминиевые с навинченными полимерными бушонами из полиэтилена низкого давления или импортные (с навинченными полимерными бушонами из полиэтилена высокой прочности).

Каждую тубу с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

При температуре не выше 8 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения / организация, принимающая претензии потребителей

Публичное акционерное общество «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий "Синтез"» (ПАО «Синтез»), Россия.

640008, Курганская обл., г. Курган, проспект Конституции, д. 7.

Телефон: +7 (495) 646-28-68

e-mail: info@binnopharmgroup.ru

Производитель

Публичное акционерное общество «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий "Синтез"» (ПАО «Синтез»), Россия

Курганская обл., г.о. г. Курган, г. Курган, проспект Конституции, стр. 7/28.

Выпускающий контроль качества

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 04.03.2024 № 4216
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Публичное акционерное общество «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий "Синтез"» (ПАО «Синтез»), Россия.

Курганская обл., г.о. г. Курган, г. Курган, проспект Конституции, стр. 7/32.