

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ВАЗОСПОНИН

Регистрационный номер:**Торговое наименование:** Вазоспонин**Международное непатентованное или группировочное наименование:** Диоскореи
ниппонской корневищ с корнями экстракт**Лекарственная форма:** таблетки**Состав****Состав на одну таблетку:***Активный компонент*

Полиспонин (Диоскореи ниппонской корневищ с корнями экстракт) экстракт сухой с содержанием суммы фураностаноловых агликонов в пересчете на диосгенин и абсолютно сухое вещество 1,0 %	– 0,10 г
--	----------

Вспомогательные вещества

Сахар молочный (лактозы моногидрат)	– 0,017 г
Крахмал картофельный	– 0,013 г
Магния оксид	– 0,007 г
Кальция стеарат	– 0,003 г

Описание

Таблетки круглые плоскоцилиндрической формы с фаской, от светло-коричневого до коричневого цвета с более светлыми и более темными вкраплениями.

Фармакотерапевтическая группа

Гиполипидемическое средство растительного происхождения.

Код АТХ

C10AX.

Фармакологические свойства

Снижает уровень холестерина, повышает содержание фосфолипидов в крови и снижает коэффициент холестерин/фосфолипиды; снижает артериальное давление.

Показания к применению

Препарат Вазоспонин показан к применению у взрослых при: гиперхолестеринемии (легкой и умеренной); атеросклерозе сосудов головного мозга как в начальных его стадиях (в целях профилактики), так и при выраженных формах заболевания; при атеросклерозе сосудов сердца и при сочетании атеросклероза с гипертонической болезнью (в составе комплексной терапии).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, возраст до 18 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания.

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания в связи с отсутствием специальных данных о безопасности применения у данной категории пациентов.

Способ применения и дозы

Внутрь. По 1-2 таблетки 2-3 раза в день после еды. Лечение проводят циклами по 20-30 дней с 7-10-дневными перерывами. Курс лечения 3-4 месяца.

Побочное действие

Возможные нежелательные реакции при приеме лекарственного препарата распределены по системно-органным классам:

Нарушения со стороны иммунной системы: аллергические реакции (кожный зуд);

Нарушения со стороны метаболизма и питания: снижение аппетита;

Нарушения со стороны нервной системы: повышенное потоотделение.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

При передозировке возможно усиление дозозависимых побочных эффектов.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не установлено.

Особые указания

Вспомогательные вещества

Если у вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом данного лекарственного препарата.

Пациентам с редко встречающейся наследственной непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы лопарей или глюкозо-галактозной мальабсорбцией не следует принимать этот препарат.

С осторожностью

Артериальная гипотония.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не влияет на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.).

Форма выпуска

Таблетки, 100 мг.

По 10 или 30 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

2, 3, 5 или 9 контурных ячейковых упаковок по 10 таблеток или 3, 6 контурных ячейковых упаковок по 30 таблеток вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

Московская обл., г. Серпухов, п. Оболенск, тер. Квартал А, д. 14.

Держатель регистрационного удостоверения / Организация, принимающая претензии от потребителей

Закрытое акционерное общество «ВИФИТЕХ» (ЗАО «ВИФИТЕХ»), Россия

Адрес: 142279, Московская обл., г. Серпухов, п. Оболенск, ГНЦ ПМ.

Телефон: (495) 716-15-81, 716-15-90.

Адрес электронной почты: vifiteh@mail.ru