МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНЗДРАВ РОССИИ
№ П015188/01- 060317
СОГЛАСОВАНО

Инструкция

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Доксорубицин-Эбеве®

концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения, 2 мг/мл

Эбеве Фарма Гес.м.б.Х. Нфг. КГ, Австрия

Изменение № 1

Срок введения изменений с «__»_060317_____ 20___г.

Старая редакция	Новая редакция
Условия хранения В защищенном от света месте, при температуре от 2 до 8 °С. Примечание: При хранении в холодильнике препарат может приобретать гелеобразную консистенцию, которая исчезает при выдерживании препарата при температуре 15-25 °С в течение 2-4 часов. Хранить в недоступном для детей месте.	**Условия хранения** В защищенном от света месте, при температуре от 2 до 8 °С. Примечание: 1. При хранении в холодильнике препарат может приобретать гелеобразную консистенцию, которая исчезает при выдерживании препарата при температуре 15 – 25 °С в течение 2 – 4 часов. 2. Возможно хранение после первого вскрытия до 28 дней при температуре от 2 до 8 °С в контролируемых и валидированных асептических условиях.

Срок годности 2 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.	Хранить в недоступном для детей месте. **Срок годности** 2 года. После вскрытия флакона – 28 дней. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Медицинский директор
ЗАО «Сандоз»

Королева М. Г.