МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

УРОЛЕСАН®

Регистрационный номер:

Торговое название препарата: УРОЛЕСАН®

Лекарственная форма: капли для приема внутрь.

Состав

1 мл препарата содержит:

Активные вещества:

Пихты масло 67,60 мг;

Мяты перечной листьев масло 16,90 мг;

Клещевины обыкновенной семян масло 92,95 мг;

Моркови дикой семян экстракт жидкий (1:1) 194,35 мг;

Хмеля соплодий экстракт жидкий (1:1) 278,80 мг;

Душицы обыкновенной травы экстракт жидкий (1:1) 192,95 мг;

Вспомогательное вещество:

Динатрия эдетат 0,04 мг.

Описание

Жидкость от зеленовато-коричневого до коричневого цвета, с характерным запахом мяты.

Фармакотерапевтическая группа

Спазмолитическое средство растительного происхождения

Код АТХ: G04BC

Фармакологические свойства

Оказывает спазмолитическое, противовоспалительное, антисептическое действие, усиливает желчеобразование и желчевыделение, повышает диурез, подкисляет мочу, увеличивает выделение мочевины и хлоридов.

77934

Показания к применению

В комплексной терапии острого цистита, пиелонефрита, мочекаменной болезни, холецистита, дискинезии желчевыводящих путей по гиперкинетическому типу, желчекаменной болезни.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, изжога, тошнота, диарея, возраст до 18 лет.

С осторожностью

Заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Не рекомендуется применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания в связи с отсутствием специальных исследований.

Способ применения и дозы

Принимают внутрь по 8-10 капель на кусочке сахара 3 раза в день до еды.

Длительность курса лечения зависит от тяжести заболевания и составляет от 5 до 30 дней.

При почечных и печеночных коликах разовая доза может быть повышена до 15-20 капель.

Увеличение разовой дозы, длительности и проведение повторного курса лечения возможно только по рекомендации врача.

Побочное действие

Возможны:

- со стороны желудочно-кишечного тракта: диспепсические явления (тошнота, рвота, диарея, абдоминальные боли);
- аллергические реакции (покраснение лица, кожная сыпь, зуд, ангионевротический отек;
- со стороны центральной и периферической нервной системы: головокружение, общая слабость;
- со стороны сердечно-сосудистой системы: артериальная гипертензия, гипотензия.

77934

Передозировка

Возможно усиление дозозависимых побочных эффектов (в том числе: тошнота, рвота, абдоминальные боли, головокружение). Лечение симптоматическое: обильное теплое питье, покой, активированный уголь, атропина сульфат (0,0005-0,001 г).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Взаимодействие с другими лекарственными средствами не описано.

Особые указания

Не применять препарат, если диаметр камней в почках превышает 3 мм.

Препарат содержит 60% этилового спирта. В максимальной разовой дозе препарата содержание абсолютного этилового спирта составляет 0,47 г, в максимальной суточной дозе препарата - 1,42 г.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

В рекомендуемых дозах препарат не оказывает влияние на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций.

Форма выпуска

Капли для приема внутрь.

По 25 мл во флакон-капельницу оранжевого стекла, укупоренный пробкой и крышкой пластмассовой.

На флакон наклеивают этикетку. Каждый флакон вместе с пробкой-капельницей и инструкцией по применению вкладывают в пачку.

По 25 мл во флакон-капельницу оранжевого стекла, укупоренный пробкой-капельницей и укупорочно-навинчиваемой крышкой с контролем первого вскрытия, или укупорочно-навинчиваемой крышкой с логотипом Корпорации «Артериум» с контролем первого вскрытия.

На флакон наклеивают этикетку.

Каждый флакон вместе с инструкцией по применению вкладывают в пачку.

Срок годности

2 года.

Не использовать препарат после истечения срока годности.

Условия хранения

В оригинальной упаковке при температуре не выше 20 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель

АО «ГАЛИЧФАРМ»,

Украина, 79024, г. Львов, ул. Опрышковская, 6/8.

Тел/факс: (38032) 294-99-94

Организация, принимающая претензии потребителей

АО «ГАЛИЧФАРМ»,

Украина, 79024, г. Львов, ул. Опрышковская, 6/8.

Тел/факс: (38032) 294-99-94

Генеральный директор
ООО «Экспертно-юридический центр
по лекарственным средствам и
средствам медицинского применения» Ю. Г. Ивасько

МЗ РФ
ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ
ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ
ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

77934