ЛП-№(009266)-(РГ-RU) от 14.03.2025

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.03.2025 № 6684
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

УРОХОЛ®

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Урохол®

Международное непатентованное или группировочное наименование: Душицы обыкновенной травы экстракт+Моркови дикой семян экстракт+Мяты перечной листьев масло+Пихты сибирской хвои масло+Хмеля обыкновенного соплодий экстракт

Лекарственная форма: капли для приема внутрь

Состав

100 г препарата содержат:

Действующие вещества

Хмеля обыкновенного соплодий экстракт (Хмеля экстракт жидкий)	–	32,995 г
Моркови дикой семян экстракт (Моркови дикой плодов экстракт жидкий)	–	23,000 г
Душицы обыкновенной травы экстракт (Душицы экстракт жидкий)	–	23,000 г
Пихты сибирской хвои масло (Пихтовое масло)	–	8,000 г
Мяты перечной листьев масло (Мяты перечной масло)	–	2,000 г

Вспомогательные вещества

Клещевины обыкновенной семян масло (касторовое масло)	–	11,000 г
Динатрия эдетат (трилон Б)	–	0,005 г

Описание

Жидкость от зеленовато-коричневого до коричневого цвета с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые в урологии; другие средства, применяемые в урологии.

Код АТХ

G04BX.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.03.2025 № 6684
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Комбинированный препарат. Оказывает спазмолитическое, антисептическое и противовоспалительное действие, повышает диурез, подкисляет мочу, увеличивает выделение мочевины и хлоридов, усиливает желчеобразование и желчеотделение.

Фармакокинетика

Препарат содержит сложный комплекс биологически активных веществ, в связи с чем проведение его фармакокинетических исследований не представляется возможным.

Показания к применению

В комплексной терапии острого цистита, пиелонефрита, мочекаменной болезни, холецистита, дискинезии желчевыводящих путей по гиперкинетическому типу, желчнокаменной болезни.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, изжога, тошнота, диарея, диаметр камней в почках более 3 мм, беременность и период грудного вскармливания, возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных по безопасности и эффективности в данной возрастной популяции).

С осторожностью

Алкоголизм, заболевания печени, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, эпилепсия.

Если у Вас одно из перечисленных заболеваний/состояний или факторов риска, перед применением препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Применение во время беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата во время беременности и в период грудного вскармливания противопоказано (в связи с отсутствием клинических данных по эффективности и безопасности).

Способ применения и дозы

Внутрь, по 8-10 капель на кусочке сахара 3 раза в день до еды.

Длительность курса лечения зависит от тяжести заболевания и составляет от 5 до 30 дней.

При почечных и печеночных коликах разовая доза может быть увеличена до 15-20 капель.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.03.2025 № 6684
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Увеличение разовой дозы, длительности и проведение повторного курса лечения возможно только по рекомендации врача.

Если после 5-7 дней лечения улучшения не наступает, или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Побочное действие

Нежелательные реакции распределены в соответствии с классификацией поражения органов и систем органов согласно словарю MedDRA.

Нарушения со стороны иммунной системы: аллергические реакции (покраснение лица, кожная сыпь, зуд, ангионевротический отек).

Нарушения со стороны нервной системы: головокружение, общая слабость.

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота, изжога, диарея, абдоминальные боли.

Нарушения со стороны сосудов: повышение/снижение артериального давления.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, ***сообщите об этом врачу****.*

Передозировка

Симптомы: возможно усиление дозозависимых побочных эффектов (в том числе тошноты, рвоты, изжоги, головокружения, абдоминальных болей).

Лечение: в случае передозировки препаратом следует немедленно обратиться к врачу. Лечение симптоматическое: обильное теплое питье, покой, активированный уголь, атропина сульфат (0,0005-0,001 г).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Взаимодействие с другими лекарственными средствами не описано.

Особые указания

Препарат содержит не менее 60,0 % этилового спирта. В максимальной разовой дозе препарата содержание абсолютного этилового спирта – не более 0,2 г, в максимальной суточной дозе препарата – не более 0,6 г.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.03.2025 № 6684
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

В случае появления головокружения и тошноты при приеме препарата рекомендуется обильное теплое питье и покой.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

В период применения препарата необходимо соблюдать осторожность, а при появлении побочных реакций со стороны нервной системы (в том числе головокружение) следует воздержаться от занятия потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Форма выпуска

Капли для приема внутрь.

По 15 или 25 мл во флаконы темного стекла, укупоренные пробками-капельницами из полиэтилена высокого давления и крышками навинчиваемыми из полиэтилена высокого или низкого давления.

Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения/Производитель/Организация, принимающая претензии потребителей

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

142279, Московская обл., г. Серпухов, п. Оболенск, ГНЦ ПМ.

Тел.: (495) 716-15-81, 716-15-90.