ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
Ферро-Фольгамма®

Регистрационный номер:

Торговое название: Ферро-Фольгамма®

Международное непатентованное название
Лекарственная форма: капсулы.
Состав:
Одна капсула содержит: *активные вещества* – железа сульфат 112,6 мг (эквивалентно 37 мг иона железа), фолиевая кислота 5 мг, цианокобаламин 0,010 мг,
*вспомогательные веществ*а: аскорбиновая кислота, твердый жир, рапсовое масло, лецитин соевый, желатин, сорбитола раствор 70%, глицерол, железа оксид красный (Е 172), железа оксид черный (Е 172), этилванилин.

Описание: мягкие желатиновые капсулы продолговатой формы с двухцветной продольной окраской половинок оболочки в светло- и темно-коричневый цвета.

Фармакотерапевтическая группа: железа препарат + поливитамины.

Код АТХ: B03AE01
Фармакологическое действие:
Ферро-Фольгамма® - комплексный антианемический препарат, содержащий двухвалентное железо в виде простой соли сульфата железа, витамины B_{12}, фолиевую и аскорбиновую кислоту, предназначенный для лечения железодефицитных состояний. Железо является важной составной частью организма человека. Оно входит в состав гемоглобина, миоглобина и различных других ферментов. Аскорбиновая кислота улучшает всасывание железа в кишечнике. Витамины B_{12} и фолиевая кислота участвуют в образовании и созревании эритроцитов.
Активные компоненты препарата Ферро-фольгамма® находятся в специальной нейтральной оболочке, которая обеспечивает их всасывание, главным образом, в верхнем отделе тонкой кишки. Отсутствие местного раздражающего действия на слизистую желудка способствует хорошей переносимости препарата со стороны желудочно-кишечного тракта.

Показания к применению
Сочетанные железо-фолиево-B_{12}-дефицитные анемии, вызванные хроническими кровопотерями (желудочное, кишечное кровотечение, кровотечение из мочевого пузыря, геморроидальных узлов, мено-метроррагии), а также хроническим алкоголизмом, инфекциями, приемом противосудорожных и пероральных контрацептивных препаратов; анемии во время беременности и кормления грудью,
Профилактика дефицита железа и фолиевой кислоты в втором и третьем триместрах беременности, в послеродовом периоде, во время кормления грудью.

Противопоказания
Анемии, не вызванные дефицитом железа (например, гемолитические анемии или изолированная мегалобластная анемия, вызванная недостатком витамина B_{12}), гиперчувствительность, печеночная недостаточность.
Избыточное содержание железа в организме (например, гемосидероз, гемохроматоз).
Расстройство механизмов утилизации железа (например, свинцовая анемия, сидероахрестическая анемия).

Способ применения и дозы

Внутрь по 1-2 капсулы после еды. Анемия: легкая форма по 1 капсуле 3 раза в день в течение 3-4 недель; при средне-тяжелом течении - по 1 капсуле 3 раза в день в течение 8-12 недель; при тяжелой форме - по 2 капсулы 3 раза в день, в течение 16 недель и более. Во время беременности - для профилактики недостатка фолиевой кислоты и железа - по 1 капсуле 3 раза в день в 2 и 3 триместрах, в послеродовом периоде во время кормления грудью.

Побочное действие

Тошнота, аллергические реакции: экзематозные явления, крапивница, анафилактический шок, анафилактоидные реакции.

Передозировка

Характеризуется появлением эпигастральных болей, тошноты, рвоты, расстройства стула, сонливости, бледности, развитием шокового состояния вплоть до комы. Рекомендуемые лечебные мероприятия включают промывание желудка, назначения десферроксамина и организацию адекватной поддерживающей терапии.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Органические кислоты, соли кальция, фосфаты, фитин, холестирамин, а также антацидные препараты, содержащие алюминий, магний, кальций нарушают всасывание железа вследствие образования нерастворимых комплексов. Препараты, содержащие ферменты поджелудочной железы, могут уменьшать всасывание железа.

При одновременном применении фенобарбитала, карбамазепина, вальпроата, сульфасалазина, гормональных контрацептивов, антагонистов фолиевой кислоты, триметоприма, пириметамина и триамтерона снижается усвояемость фолиевой кислоты.

Соли железа нарушают всасывание в желудочно-кишечном тракте антибиотиков группы тетрациклина.

Твердая пища, хлеб, сырые злаки, молочные продукты, яйца снижают абсорбцию железа, при одновременном назначении с антибиотиками группы тетрациклина, а также с пенициллинамином образуются комплексные соединения, уменьшающие всасывание железа и снижающие противомикробную активность антибиотиков.

Особые указания:

Темная окраска стула обусловлена выведением не всосавшегося железа и не имеет клинического значения.

Форма выпуска

Капсулы.

По 10 капсул в блистер, изготовленный из поливинилхлоридной пленки и алюминиевой фольги.

По 2 или 5 блистеров вместе с инструкцией по применению в картонной пачке.

Условия хранения

При температуре не выше 25° С.

Хранить в местах недоступных для детей.

Срок годности

5 лет

Не использовать после срока, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

По рецепту.

Производитель
Верваг Фарма ГмбХ и Ко. КГ, произведено Ц.П.М Контракт Фарма ГмбХ и Ко. КГ, Калвер штрассе, 7, 71034, Бёблинген, Германия.

Представительство/организация, принимающая претензии: 117587, Москва, Варшавское шоссе, 125 ж. Тел: 382-85-56

Директор ИДКЭЛС
профессор В. В. Чельцов

Представитель фирмы Л. А. Максимова