ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
ХОЛЕНЗИМ

Регистрационный номер:

Торговое название: Холензим

Группировочное название: Желчь + Порошок из pancreas и слизистой тонкой кишки&

Лекарственная форма: таблетки, покрытые оболочкой

Описание: таблетки, покрытые оболочкой, белого цвета, круглой формы с двояковыпуклыми поверхностями.

Состав:
1 таблетка содержит активные вещества: желчь крупного рогатого скота, овец, коз (желчь бычья, овец, коз), порошок – 0,1 г, поджелудочная железа крупного рогатого скота, свиней, порошок – 0,1 г, оболочка слизистая (шлям) тонкого отдела кишечника свиней, порошок - 0,1 г.
Состав оболочки: сахароза (сахар-рафинад), воск пчелиный, масло подсолнечное, парафин нефтяной твердый, мука пшеничная, магния гидроксикарбонат (магния карбонат основной).

Фармакотерапевтическая группа: желчегонное средство.

Код АТХ: [A05AA]

Фармакологические свойства
Комбинированный препарат животного происхождения, оказывает желчегонное действие. Пищеварительные ферменты (трипсин, амилаза, липаза) и желчь облегчают переваривание белков, жиров, углеводов, что способствует их более полному всасыванию в тонком кишечнике. Улучшает функциональное состояние желудочно-кишечного тракта, нормализует процесс пищеварения.

Показания к применению
В качестве желчегонного и пищеварительного ферментного средства при заболеваниях и функциональных расстройствах желудочно-кишечного тракта: хронический гепатит, хронический холецистит, хронический панкреатит, гастрит, колит; метеоризм, диарея неинфекционного генеза.
Для улучшения переваривания пищи у лиц с нормальной функцией желудочно-кишечного тракта в случае погрешностей в питании (употребление жирной пищи, большого количества пищи, нерегулярное питание), и при нарушениях жевательной функции, малоподвижном образе жизни, длительной иммобилизации.

Противопоказания
Гиперчувствительность к компонентам препарата, острый панкреатит, обострение хронического панкреатита, обтурационная желтуха, детям до 12 лет.

Способ применения и дозы
Внутрь, после еды. Взрослым и детям старше 12 лет по 1 таблетке 1-3 раза в сутки. Применять таблетки не разжевывая, с большим количеством жидкости.
Не рекомендуется превышать суточную дозу.

Побочное действие
Аллергические реакции (чиханье, слезотечение, покраснение кожи, кожная сыпь). При их появлении необходимо прекратить употребление препарата и обратится к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Одновременное применение антацидных средств, содержащих кальция карбонат и/ или магния гидроксид, может привести к снижению эффективности препарата. При длительном применении возможно снижение всасывания железа.

Передозировка
При длительном применении высоких доз возможны тошнота, изжога, диарея, кожный зуд, повышение уровня трансаминаз в крови.

Форма выпуска
Таблетки, покрытые оболочкой.
По 20, 30, 50 таблеток в банке оранжевого стекла или в банке полимерной.
По 10 или 25 таблеток в контурной ячейковой упаковке.
По 10 таблеток в контурной безъячейковой упаковке.
Одна банка, 1, 2 контурные ячейковые упаковки по 25 таблеток или 1, 2, 3, 4, 5 контурных упаковок по 10 таблеток с инструкцией по применению помещены в картонную пачку.
По 100 контурных упаковок с приложением равного количества инструкций помещены в коробку из картона.

Срок годности
2 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения
В сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 °С.

Условия отпуска из аптек
Без рецепта.

Производитель
ОАО «Биосинтез, г. Пенза.

Юридический адрес и адрес для принятия претензий:
ОАО «Биосинтез», Россия, 440033 г. Пенза, ул. Дружбы, 4, тел/факс (8412) 57-72-69.

И.о. директора ИДКЭЛС А.Н. Васильев

Генеральный директор
ОАО «Биосинтез» А.И. Черницов