МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП-003233 - 061015
СОГЛАСОВАНО

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

ЖЕНЬШЕНЯ НАСТОЙКА

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Женьшеня настойка

Группировочное название: Женьшень

Лекарственная форма: настойка

Состав.

Для приготовления 1000 мл настойки необходимо:

Активное вещество:

Женьшеня корни - 100 г

Вспомогательные вещества:

этанол (этиловый спирт) 70 % - достаточное количество до получения 1000 мл настойки.

Описание: прозрачная жидкость от желтоватого до желтого цвета с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа: общетонизирующее средство растительного происхождения.

Код АТХ: A13A

Фармакологические свойства

Фармакологическая активность обусловлена содержанием тритерпеновых гликозидов (панаксозиды А и В, панаквилон, панаксин), эфирных и жирных масел, пектиновых веществ, витаминов, микро- и макроэлементов, а также фитоэстрогенов и даукостерина.

Стимулирует центральную нервную систему, оказывает общетонизирующее, гипертен-

90396

МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП-003233 - 061015
СОГЛАСОВАНО

зивное и гипогликемическое действие: улучшает аппетит, повышает артериальное давление, умственную и физическую работоспособность, стимулирует половую функцию; уменьшает общую слабость, повышенную утомляемость, сонливость; снижает содержание холестерина и сахара в крови, активирует деятельность коры надпочечников.

Показания к применению

Артериальная гипотензия (пониженное артериальное давление), астенический синдром, физическое и психическое переутомление, неврастенический синдром, период реконвалесценции после перенесенных длительных и тяжелых, в том числе инфекционных заболеваний, нейроциркуляторная дистония по гипотоническому типу, в комплексной терапии при ослаблении половой функции на почве неврастении.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, артериальная гипертензия (повышенное артериальное давление), повышенная возбудимость, эпилепсия, судорожные состояния, расстройства сна, лихорадочный синдром на фоне острых инфекционных заболеваний, кровоточивость, хронические заболевания печени, детский возраст до 12 лет.

С осторожностью

Алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, заболевания печени, детский возраст с 12 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата во время беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Способ применения и дозы.

Внутрь. Взрослым и детям старше 12 лет за 30-40 минут до еды по 15-25 капель 2-3 раза в день.

Максимальная суточная доза 75 капель.

Курс лечения 30-40 дней. Целесообразность проведения повторного курса определяется врачом.

Побочное действие

Аллергические реакции, тахикардия, головная боль, нарушения сна, повышение артериального давления, гипогликемия.

Передозировка

При превышении рекомендуемых доз возможно усиление дозозависимых побочных эффектов; носовое кровотечение.

Лечение симптоматическое.

90396

МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП-003233 - 061015
СОГЛАСОВАНО

Взаимодействие с другими лекарственными средствами.

Усиливает действие психостимуляторов и аналептиков (в т.ч. кофеина, камфоры и др.). Проявляет антагонизм при взаимодействии с лекарственными средствами, угнетающими центральную нервную систему (противоэпилептические препараты, нейролептики, транквилизаторы и седативные средства). Усиливает действие гипогликемических лекарственных средств. Усиливает действие варфарина. Повышает риск развития резистентности к петлевым диуретикам.

Особые указания

Препарат не следует применять во второй половине дня во избежание нарушения сна. Имеется четко выраженная сезонность действия: применение осенью и зимой наиболее эффективно.

В максимальной суточной дозе (75 капель) препарат содержит 0,7 г абсолютного этилового спирта, в максимальной разовой дозе (25 капель) препарат содержит 0,23 г абсолютного этилового спирта.

Влияние на способность к вождению транспортных средств и управлению механизмами, требующими повышенной концентрации внимания

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Настойка.

По 25 мл во флаконы из стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками пластмассовыми и крышками навинчиваемыми.

По 25 мл во флаконы-капельницы из стекла, укупоренные пробками-капельницами и крышками навинчиваемыми.

По 25 мл во флаконы полимерные, укупоренные пробками-капельницами полимерными или пробками полимерными и крышками полимерными навинчиваемыми.

Каждый флакон, флакон-капельницу вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

По 40 флаконов или флаконов-капельниц по 25 мл с равным количеством инструкций по медицинскому применению помещают в ящик из гофрированного картона или коробку из картона («Для стационаров»).

По 5, 10, 20 л в канистры полиэтиленовые («Для стационаров»).

90396

МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП-003233 - 061015
СОГЛАСОВАНО

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре от 8 до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускается без рецепта.

Производитель/Организация, принимающая претензии

ПХФК ОАО «Медхимпром», Россия

143980, Московская обл., г. Железнодорожный, ул. Заводская, д. 31.

Тел/факс: (495) 522-53-11 (495) 522-97-44.

Производственная площадка

140730, Московская область, г. Рошаль, ул. Косякова, д. 18.

Генеральный директор
ПХФК ОАО «Медхимпром» М.А. Шибаев

ФГБУ ЦМЭЭИН
МЗ РФ
ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

90396