ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА
ДЕПРИМ® /DEPRIM®

Регистрационный номер ЛП№ 016054/01

Торговое название препарата: ДЕПРИМ®

Лекарственная форма: таблетки, покрытые оболочкой

Состав:
Каждая таблетка содержит 60 мг стандартизированного сухого экстракта зверобоя (*Hypericum perforatum L., herba, extractum siccum normatum*) с содержанием общего гиперицина 0.3 мг.
Вспомогательные вещества:
ядро: лактоза, целлюлоза микрокристаллическая, тальк, магния стеарат, кремния диоксид коллоидный;
оболочка: гидроксипропилметилцеллюлоза, полиэтиленгликоль, тальк, карнаубский воск, глазурь зеленая, глазурь синяя, титана диоксид.

Описание: круглые двояковыпуклые таблетки зеленого цвета, покрытые оболочкой.

Фармакотерапевтическая группа: седативное средство растительного происхождения.
Код АТХ A13A.

Фармакологические свойства
Средство растительного происхождения, оказывает анксиолитическое и антидепрессивное действие. Основные активные вещества зверобоя - гиперицин, псевдогиперицин, гиперфорин и флавоноиды - улучшают функциональное состояние центральной и вегетативной нервной системы.
Деприм® улучшает настроение, повышает психическую и физическую активность, нормализует сон.

Показания к применению
Деприм® применяют при снижении настроения, депрессивных состояниях легкой и средней степени тяжести, сопровождающихся тревогой, в т.ч. связанных с климактерическим синдромом, при повышенной чувствительности к перемене погоды.

Противопоказания
- повышенная индивидуальная чувствительности к ингредиентам препарата;
- депрессии тяжелой степени, в этом случае следует обратиться к врачу;
- детский возраст до 6 лет.

Применение при беременности и периоде грудного вскармливания
Несмотря на отсутствие данных о вредном воздействии препарата, приём Деприма® в это время возможен только в том случае, если ожидаемая польза для беременной или матери превосходит потенциальный риск для плода и новорожденного.

Способ применения и дозы
Таблетки принимают внутрь и запивают водой.
Взрослые и подростки старше 12 лет: по одной таблетке 3 раза в сутки.
Дети от 6 до 12 лет: только под наблюдением врача, по 1 - 2 таблетке в сутки, утром и днем.
Наибольший эффект препарата достигается при регулярном применении в течение нескольких недель.
Лечебное действие Деприма® проявляется спустя 10-14 дней после начала приема.
Если в течение 4-6 недель после начала лечения улучшения состояния не наступило, следует прекратить прием Деприма® и проконсультироваться с врачом.
Пациент обязательно должен сообщить своему лечащему врачу о том, что он принимает Деприм®.
При пропуске одного приема Деприма®
• следует принять лекарство как можно скорее.
•если подходит время приема следующей дозы препарата, не принимайте дополнительной дозы для компенсации пропущенного приема.
• не принимайте одновременно две дозы препарата.

Побочные эффекты
Желудочно-кишечные расстройства (тошнота, рвота, запор и т.п.), аллергические реакции – зуд и покраснение кожи, чувство усталости или беспокойство.
У людей с повышенной чувствительностью к солнечному свету одновременный прием солнечных ванн и препарата может вызывать ожоги (фотосенсибилизация).
При появлении побочных эффектов, не описанных в данной инструкции, следует проконсультироваться у врача.

Передозировка
Острых отравлений препаратами зверобоя у людей не отмечено.
При слишком большом количестве принятого препарата возможно усиление побочных эффектов. Меры помощи: следует отменить препарат, принять активированный уголь и обратится к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Деприм® активирует микросомальное окисление (цитохром Р 450), поэтому препарат следует принимать с осторожностью при одновременном лечении препаратами, содержащими дигоксин, противоастматическими препаратами, содержащими теофиллин, противосудорожными средствами, антидепрессантами (трициклическими, избирательными ингибиторами обратного захвата серотонина, ингибиторами МАО), препаратами против мигрени (триптаны), циклоспорином, индинавиром, резерпином и при приеме пероральных противозачаточных средств, а также может усиливать действие средств для общей анестезии и наркотических анальгетиков. В этом случае перед началом приема Деприма® следует посоветоваться с врачом.

Особые указания:
Во время лечения Депримом® не рекомендуется принимать солнечные ванны или пользоваться солярием.
Во время лечения Депримом® следует воздержаться от употребления алкогольных напитков.

Форма выпуска:
По 10 таблеток в блистер, по 3 блистера вместе с инструкцией по применению вкладывают в картонную пачку.

Условия хранения:
Хранить при температуре не выше 25°С.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:
2 года.
Дата окончания срока годности отпечатана на упаковке. Не используйте лекарство по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек:
Без рецепта.

Производитель:
Лек д.д.
Веровшкова 57, Любляна, Словения
Представительство в Москве: 121002, Староконюшенный переулок, дом 10/10, стр. 1.
Тел. 258-8484, Факс 258-8485.

Директор ИДКЭЛ, проф. В.В.Чельцов

Представитель фирмы Е.Ю. Барманова