

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

НЕФРОСТЕН®

Регистрационный номер:

Торговое наименование: НЕФРОСТЕН®

Международное непатентованное или группировочное наименование:
Золототысячника трава + Любистока лекарственного корня + Розмарина лекарственного
листья

Лекарственная форма: раствор для приема внутрь

Состав

Для приготовления препарата необходимо:

Активные компоненты: золототысячника трава – 0,6 г, любистока лекарственного
корня – 0,6 г, розмарина лекарственного листьев – 0,6 г.

Вспомогательные вещества: спирт этиловый (этанол) 62 % – 29,0 г, вода очищенная –
достаточное количество для получения 100 г препарата.

Описание

Прозрачная или слегка мутная жидкость желтовато-коричневого цвета, с характерным
запахом. Возможно выпадение небольшого осадка в процессе хранения.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые в урологии; другие средства, применяемые в урологии.

Код АТХ: G04BX

Фармакологические свойства

Комбинированный препарат растительного происхождения, оказывает мочегонное,
спазмолитическое, противовоспалительное, противомикробное действие.

Показания к применению

Препарат применяется в комплексной терапии при лечении хронических инфекций
мочевого пузыря (цистита) и почек (пиелонефрита), при неинфекционных хронических
воспалениях почек (гломерулонефрит, интерстициальный нефрит), в качестве средства,

препятствующего образованию мочевых камней (также после удаления мочевых камней).

Противопоказания

Гиперчувствительность к активным компонентам или к любому из вспомогательных веществ, детский возраст (до 1 года). Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, алкоголизм (в том числе после антиалкогольного лечения) – в связи с содержанием этанола (спирта этилового).

С осторожностью

Применение препарата у пациентов с заболеваниями печени, черепно-мозговой травмой, эпилепсией, заболеваниями головного мозга, детям старше 1 года возможно, только после консультации с врачом (в связи с наличием в составе препарата этилового спирта).

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата во время беременности и в период грудного вскармливания возможно только по назначению врача, в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

Способ применения и дозы

Внутрь, разведя в небольшом количестве воды или запивая водой.

Взрослым: по 50 капель 3 раза в день.

Детям школьного возраста: по 25 капель 3 раза в день.

Детям дошкольного возраста (старше 1 года): по 15 капель 3 раза в день.

После ослабления остроты заболевания следует продолжить лечение препаратом в течение 2-4 недель.

При необходимости, например, чтобы смягчить горький вкус для детей, препарат можно принимать вместе с другими жидкостями.

Во время лечения препаратом рекомендуется потребление большого количества жидкости.

Перед применением взбалтывать!

Если на фоне терапии улучшение не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции. Возможны диспепсические расстройства (тошнота,

рвота, диарея).

При первых признаках аллергической реакции следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано. В случае передозировки препарата назначается симптоматическое лечение.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Комбинация с антибактериальными средствами возможна и целесообразна. Сведения о клинически значимом взаимодействии с другими лекарственными препаратами отсутствуют.

В случае необходимости одновременного применения каких-либо других лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом.

Особые указания

При отеках, вызванных нарушением функции сердца или почек, потребление большого количества жидкости противопоказано.

При нарушенной функции почек препарат не следует назначать в качестве монотерапии. В случае воспалительного заболевания почек необходимо обратиться к врачу за консультацией.

В случае наличия крови в моче, болей при мочеиспускании или при острой задержке мочи необходимо срочно обратиться к врачу.

В разовой дозе препарата для детей от 1 года до 6 лет (15 капель) содержится до 0,14 г абсолютного этилового спирта; в разовой дозе препарата для детей школьного возраста (25 капель) содержится до 0,24 г абсолютного этилового спирта; в разовой дозе препарата для взрослых (50 капель) содержится до 0,47 г абсолютного этилового спирта.

В максимальной суточной дозе препарата для взрослых (150 капель) содержится до 1,42 г абсолютного этилового спирта.

В процессе хранения возможно легкое помутнение или выпадение незначительного осадка, что не влияет на эффективность препарата.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

В период применения препарата необходимо соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Форма выпуска

Раствор для приема внутрь.

По 50, 95 и 100 мл во флаконы из коричневого или оранжевого стекла для лекарственных средств, укупоренные капельницами и крышками навинчиваемыми с контролем первого вскрытия.

Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

После вскрытия флакона срок годности 6 месяцев.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения / Производитель / Организация, принимающая претензии потребителей

ЗАО «Эвалар», Россия, 659332, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, д. 23/6, тел. (3854) 39-00-50, тел. 8-800-200-52-52, www.evalar.ru.