

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО
ПРЕПАРАТА
ФИТОФРОН®

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Фитофрон®

Международное непатентованное или группировочное наименование:

Золототысячника трава + Любистока лекарственного корень + Розмарина лекарственного
листья

Лекарственная форма: раствор для приема внутрь

Состав (на 100 г):

Активный компонент: Фитофрон®, экстракт жидкий из лекарственного растительного
сырья: золототысячника травы (0,6 г); любистока лекарственного корней (0,6 г); розмарина
лекарственного листьев (0,6 г) – 29,0 г.

Вспомогательное вещество: вода очищенная – 71,0 г.

Описание

Прозрачная или слегка мутная жидкость от светло-желтого до коричневого цвета, возможно
с зеленоватым оттенком, с характерным запахом. Возможно помутнение или выпадение
осадка в процессе хранения.

Фармакотерапевтическая группа: средства, применяемые в урологии; другие средства,
применяемые в урологии.

КОД АТХ: G04BX

Фармакологическое действие

Комбинированный препарат растительного происхождения; оказывает мочегонное,
спазмолитическое, противовоспалительное, противомикробное действие.

Показания к применению

Препарат применяется в комплексной терапии при лечении хронических инфекций
мочевого пузыря (цистита) и почек (пиелонефрита), при неинфекционных хронических
воспалениях почек (гломерулонефрит, интерстициальный нефрит), в качестве средства,
препятствующего образованию мочевых камней (также после удаления мочевых камней).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст (до 1 года).

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения.

Алкоголизм (в том числе после антиалкогольного лечения).

С осторожностью: заболевания печени, черепно-мозговая травма, заболевания головного

мозга, детский возраст (старше 1 года) (применение возможно только после консультации с врачом) – в связи с содержанием этанола.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно только по назначению врача, в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

Способ применения и дозы

Внутрь, разведя в небольшом количестве воды или запивая водой.

Взрослым по 70 капель (3,5 мл) 3 раза в день.

Детям от 1 года до 6 лет по 20 капель (1,0 мл) 3 раза в день.

Детям от 6 до 12 лет по 35 капель (1,75 мл) 3 раза в день.

Длительность курса лечения зависит от течения заболевания. После наступления улучшения (завершения острой фазы заболевания) следует продолжить лечение препаратом в течение 2-4 недель.

При необходимости, например, чтобы смягчить горький вкус для детей, препарат можно принимать вместе с другими жидкостями.

Во время лечения препаратом рекомендуется потребление большого количества жидкости.

Перед применением взбалтывать.

Для дозирования препарата возможно использование шприца-дозатора (при наличии его в упаковке).

Инструкция по дозированию раствора с помощью шприца-дозатора:

- Откройте флакон и опустите шприц во флакон с раствором.
- Заполните шприц раствором, потянув поршень вверх до деления, соответствующего количеству миллилитров (мл) раствора.
- Содержимое шприца введите в стакан с небольшим количеством воды, надавив на поршень до упора.
- Закройте флакон.
- Промойте шприц водой.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции, расстройства желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, диарея).

При появлении признаков аллергической реакции следует прекратить прием препарата.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

На настоящий момент данные о передозировке и интоксикации отсутствуют. В случае передозировки препарата назначается симптоматическое лечение.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Комбинация с антибактериальными лекарственными средствами возможна и целесообразна. Взаимодействия с другими лекарственными средствами на настоящий момент неизвестны.

Особые указания

При отеках, вызванных нарушениями функции сердца или почек, потребление большого количества жидкости противопоказано.

При нарушенной функции почек препарат не следует назначать в качестве монотерапии.

В случае воспалительного заболевания почек необходимо обратиться к врачу за консультацией.

В случае наличия крови в моче, болей при мочеиспускании или при острой задержке мочи необходимо срочно обратиться к врачу.

В процессе хранения возможно легкое помутнение или выпадение незначительного осадка, что не влияет на эффективность препарата.

Содержание в препарате этилового спирта составляет от 16,0 до 21,5 % (в объемном отношении), что соответствует содержанию абсолютного этилового спирта 0,44 г – 0,61 г в разовой дозе препарата (3,5 мл) и 1,32 г – 1,83 г в максимальной суточной дозе препарата (10,5 мл).

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Содержание в препарате этилового спирта составляет от 16,0 до 21,5 % (в объемном отношении). В период лечения препаратом следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Раствор для приема внутрь.

По 50 или 100 мл во флаконы темного стекла, укупоренные пробками-капельницами из полиэтилена ПЭВД или пробками из полиэтилена ПЭВД с навинчиваемыми пластмассовыми крышками, или укупоренные крышками навинчиваемыми. Флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку картонную. В картонную упаковку могут вкладывать шприц-дозатор.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С, в оригинальной упаковке (в пачке картонной).

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

После вскрытия флакона использовать в течение 6 месяцев.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель / Организация, принимающая претензии:

ООО НПО «ФармВИЛАР», Россия,

249096, Калужская обл., Малоярославецкий район, г. Малоярославец,

ул. Коммунистическая, д. 115

Тел./факс: +7 (48431) 2-27-18

Владелец регистрационного удостоверения

ООО НПО «ФармВИЛАР», Россия,

249096, Калужская обл., Малоярославецкий район, г. Малоярославец,

ул. Коммунистическая, д. 115

Тел./факс: + 7 (48431) 2-27-18