

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО
ПРЕПАРАТА
ФИТОФРОН®

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Фитофрон®

Международное непатентованное или группировочное наименование:

Золототысячника трава + Любистока лекарственного корень + Розмарина лекарственного
листья

Лекарственная форма: таблетки, покрытые оболочкой

Состав (на одну таблетку):

Активный компонент: Фитофрон®, сбор-порошок из лекарственного растительного сырья:
золототысячника травы, любистока лекарственного корней, розмарина лекарственного
листьев (1:1:1), с содержанием суммы полифенолов в пересчете на пирогаллол не менее
0,74 % – 54,00 мг.

Вспомогательные вещества: крахмал кукурузный, кремния диоксид коллоидный, лактозы
моногидрат, повидон К-30.

Вспомогательные вещества оболочки: краситель железа оксид красный, рибофлавин,
сахароза, тальк, кремния диоксид коллоидный, титана диоксид, повидон К-17, магния
карбонат, воск (капол).

Описание

Круглые двояковыпуклые таблетки, оранжевого цвета, с гладкой поверхностью,
допускаются более светлые и более темные вкрапления.

Фармакотерапевтическая группа: Средства, применяемые в урологии; другие средства,
применяемые в урологии.

КОД АТХ: G04BX

Фармакологическое действие

Комбинированный препарат растительного происхождения, оказывает мочегонное,
спазмолитическое, противовоспалительное, противомикробное действие.

Показания к применению

Препарат применяется в комплексной терапии при лечении хронических инфекций
мочевого пузыря (цистита) и почек (пиелонефрита), при неинфекционных хронических
воспалениях почек (гломерулонефрит, интерстициальный нефрит), в качестве средства,
препятствующего образованию мочевых камней (также после удаления мочевых камней).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст (до 6 лет), язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, недостаточность лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата во время беременности и в период грудного вскармливания возможно только по назначению врача, в строгом соответствии с рекомендациями по применению и после оценки лечащим врачом соотношения риска и пользы.

Способ применения и дозы

Внутрь, не разжевывая, запивая небольшим количеством воды.

Взрослым по 2 таблетки 3 раза в день.

Детям школьного возраста по 1 таблетке 3 раза в день.

После ослабления остроты заболевания следует продолжить лечение в течение 2-4 недель.

Во время лечения препаратом рекомендуется потребление большого количества жидкости.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции, желудочно-кишечные нарушения (тошнота, рвота, диарея).

При появлении признаков аллергической реакции следует прекратить прием препарата.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано. В случае передозировки препарата назначается симптоматическое лечение.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Комбинация с антибактериальными лекарственными средствами возможна и целесообразна. Сведения о клинически значимом взаимодействии с другими лекарственными препаратами отсутствуют.

Особые указания

При отеках, вызванных нарушениями функции сердца или почек, потребление большого

количества жидкости противопоказано. При нарушенной функции почек препарат не следует назначать в качестве монотерапии. В случае воспалительного заболевания почек необходимо обратиться к врачу за консультацией. В случае наличия крови в моче, болей при мочеиспускании или при острой задержке мочи необходимо срочно обратиться к врачу. Пациентам с сахарным диабетом необходимо учитывать, что содержание усваиваемых углеводов в одной таблетке препарата соответствует около 0,015 ХЕ.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска

Таблетки, покрытые оболочкой.

По 10, 15, 20 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

По 1, 2, 3, 4, 5, 6 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

По 40 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

По 1, 2, 3 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона

По 30, 50, 100 таблеток в банки полимерные полипропиленовые с контролем первого вскрытия и амортизатором в комплекте с крышками полимерными полиэтиленовыми.

1 банку вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С, в оригинальной упаковке.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель / Организация, принимающая претензии потребителей

ООО НПО «ФармВИЛАР», Россия,

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 14.05.2024 № 9351
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

249096, Калужская обл., Малоярославецкий район, г. Малоярославец,

ул. Коммунистическая, д. 115

Тел./факс: +7 (48431) 2-27-18

Владелец регистрационного удостоверения

ООО НПО «ФармВИЛАР», Россия,

249096, Калужская обл., Малоярославецкий район, г. Малоярославец,

ул. Коммунистическая, д. 115

Тел./факс: + 7 (48431) 2-27-18