ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
Нейромет

Регистрационный номер:

Торговое название препарата: Нейромет

Международное непатентованное название: идебенон

Лекарственная форма: капсулы

Состав
1 капсула содержит:
активное вещество: идебенон 30 мг или 45 мг;
вспомогательные вещества: крахмал картофельный, лактоза (сахар молочный), целлюлоза микрокристаллическая, повидон (поливинилпирролидон), кросповидон (Полипласдон Икс Эл-10), магния стеарат.
Состав твердой желатиновой капсулы
для дозировки 30 мг: титана диоксид (Е171), краситель хинолиновый желтый (Е 104), краситель солнечный закат желтый (Е110), желатин;
для дозировки 45 мг: титана диоксид (Е171), железа оксид красный (Е 172), железа оксид черный (Е 172), краситель хинолиновый желтый (Е 104), краситель солнечный закат желтый (Е110), азорубин (Е 122), желатин.

Описание
Для дозировки 30 мг – твердые желатиновые капсулы № 1 желтого цвета. Для дозировки 45 мг – твердые желатиновые капсулы № 0 – корпус желтого цвета, крышечка коричневого цвета. Содержание капсул – гранулят, содержащий гранулы или порошок желтого или желто-оранжевого цвета с оранжевыми и белыми вкраплениями.

Фармакологическая группа: ноотропное средство
Код АТХ: [N06BX13]

Фармакологическое действие
Фармакодинамика
Ноотропное средство, оказывает метаболическое и трофическое действие. Повышает обменные процессы в головном мозге путем активации синтеза глюкозы и аденозинтрифосфата (АТФ), улучшает кровоснабжение и оксигенацию тканей мозга, способствует выведению лактатов; повышает интенсивность и скорость нейрофизиологических реакций мозговых структур. Замедляя перекисное окисление

липидов, предохраняет мембраны нейронов и митохондрий от повреждений. С первых дней приема проявляет антиастеническое, психостимулирующее и антидепрессивное действие, ноотропное действие проявляется через 3-4 недели приема.

Фармакокинетика

Абсорбция быстрая и высокая; Время достижения максимальной концентрации в плазме крови (TCmax) - 4 ч. Проникает через гематоэнцефалический барьер в значительных количествах и распределяется в тканях мозга. Не кумулирует. Выводится почками.

Показания

- Психоорганический синдром на фоне нарушения мозгового кровообращения и возрастных инволюционных изменений головного мозга;
- Цереброастенические расстройства сосудистой, травматической, психогенной (неврастения) этиологии: нарушения памяти и/или внимания, снижение интеллектуальной продуктивности и общей активности, эмоциональная неустойчивость;
- Астенический и астенодепрессивный синдром, умеренно выраженный депрессивный синдром; головокружение, шум в ушах.

Противопоказания

Гиперчувствительность, хроническая почечная недостаточность.

С осторожностью: беременность, период лактации.

Способ применения и дозы

Внутрь, по 30 - 45 мг 2-3 раза в день, после еды (последний прием - до 17 ч).
Курс лечения - 1,5-2 месяца. При необходимости проводят 2-3 курса в год.

Побочные эффекты

Аллергические реакции; нарушение засыпания, психоэмоциональное возбуждение, головная боль, диспепсия.

Передозировка

Симптомы: усиление выраженности побочных явлений.
Лечение: При необходимости назначают активированный уголь и проводят симптоматическую терапию.

Особые указания

В период лечения необходимо воздерживаться от вождения автотранспорта и занятий другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Капсулы по 30 мг или 45 мг.
По 10 капсул в контурную ячейковую упаковку.
По 30 капсул в банку светозащитного стекла или в банку, или флакон из полимерных материалов.
Каждую банку, флакон, или 1, 2, 3, 6 или 12 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению в пачке из картона.

Условия хранения
Список Б. В сухом месте при температуре не выше 25^{0}С.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности
2 года.
Не применять после истечения срока годности.

Условия отпуска
По рецепту.

Производитель: ОАО «Верофарм»

Юридический адрес 107023, г. Москва, Барабанный пер., д. 3.
Адрес производства и принятия претензий: 308013, г. Белгород, ул. Рабочая, д.14.
Тел. (4722) 21-32-26; 21-34-71

И.о директора ИДКЭЛС А.Н. Васильев

Начальник медицинского управления Т.И. Скоблик